

**NOTICE**

MILBEMAX Comprimés enrobés pour chats.  
MILBEMAX Comprimés enrobés pour petits chats et chatons.

**1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Elanco Europe Ltd  
Lilly House,  
Priestley Road,  
Basingstoke, RG24 9NL,  
Royaume Uni

Fabricant responsable de la libération des lots:

Novartis Santé Animale S.A.S.  
B.P. 224  
68330 Huningue  
France

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

MILBEMAX Comprimés enrobés pour chats.  
MILBEMAX Comprimés enrobés pour petits chats et chatons.

Vermifuge à large spectre

**3. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRES INGRÉDIENTS**

MILBEMAX, comprimés enrobés pour chats, petits chats et chatons sont disponibles en 2 tailles différentes :

Nom comprimé (description du comprimé)	Oxime de milbémycine par comprimé	Praxiquantel par comprimé	Excipients q.s.
MILBEMAX, comprimés pour petits chats et chatons (comprimé beiges à bruns, goût de viande de boeuf, de forme ovale, sécables).	4 mg	10 mg	132,5 mg
MILBEMAX, comprimés pour chats (comprimé rougeâtre à brun rougeâtre, goût de viande de boeuf, de forme ovale, sécables).	16 mg	40 mg	132,5 mg

**4. INDICATIONS**

MILBEMAX peut être utilisé chez le chat pour le traitement d'infections mixtes par les cestodes et les nématodes immatures et adultes des espèces suivantes:

- Cestodes : *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus multilocularis*
- Nématodes : *Ancylostoma tubaeforme*, *Toxocara cati*

Le médicament vétérinaire peut être utilisé pour la prévention de la dirofilariose (*Dirofilaria immitis*), si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué.

## 5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser les «**comprimés pour petits chats et chatons**» chez les chats de moins de 6 semaines et/ou pesant moins de 0,5 kg.

Ne pas utiliser les «**comprimés pour chats**» chez les chats pesant moins de 2 kg.

## 6. EFFETS INDÉSIRABLES

Dans des cas très rares, en particulier chez de jeunes chats, des symptômes systémiques (tels que léthargie), neurologiques (tels que tremblements musculaires et ataxie) et/ou gastro-intestinaux (tels que vomissements et diarrhée) ont été observés après administration du médicament vétérinaire.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

## 7. ESPÈCES CIBLES

Chat

## 8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

La dose minimale recommandée pour MILBEMAX comprimés est de 2 mg de milbémycine oxime et de 5 mg de praziquantel par kg de poids vif.

MILBEMAX administré en dose unique par voie orale (par la gueule), avec de la nourriture pendant ou après le repas. Cela conduit à une protection optimale contre la dirofilariose.

En fonction du poids du chat, la dose à administrer est la suivante:

Poids vif	MILBEMAX Comprimés pour petits chats et chatons	MILBEMAX Comprimés pour chats
0,5 - 1 kg	½ comprimé (de forme ovale, beiges à brun)	
>1 – 2 kg	1 comprimé (de forme ovale, beiges à brun)	
>2 – 4 kg		½ comprimé (de forme ovale, rougeâtre à brun rougeâtre)
>4 – 8 kg		1 comprimé (de forme ovale, rougeâtre à brun rougeâtre)
>8 – 12 kg		1½ comprimé (de forme ovale, rougeâtre à brun rougeâtre)

Le médicament vétérinaire peut être intégré dans un programme de prévention de la dirofilariose, si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. Le médicament vétérinaire administré chaque mois permet la prévention de la dirofilariose. Lorsqu'un traitement de prévention de la maladie du ver du cœur est administré régulièrement, un produit monovalent est à préférer.

## 9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Administrer MILBEMAX en dose unique par voie orale avec de la nourriture pendant ou après le repas. Ainsi, la protection contre la dirofilariose est optimale.

## 10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

## 11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver en dessous de 25 °C.

Protéger de la lumière en conservant le conditionnement primaire dans l'emballage extérieur.

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur la plaquette thermoformée et la boîte après EXP.

La durée de conservation des comprimés coupés est de six mois.

## **12. MISES EN GARDE PARTICULIÈRES**

À usage vétérinaire.

### **Précautions particulières d'utilisation chez l'animal**

Conformément aux bonnes pratiques vétérinaires, les animaux doivent être pesés afin de garantir une posologie correcte.

L'Echinococcose présente un risque pour l'homme. En cas d'Echinococcose, les protocoles spécifiques en terme de traitement, de suivi et de sécurité des personnes doivent être suivis. Consulter un expert ou un centre de parasitologie.

Aucun essai n'a été réalisé sur des chats sévèrement débilisés ou ayant une atteinte rénale ou hépatique importante. Dans ce type de cas, l'utilisation du médicament vétérinaire n'est pas recommandée ou seulement après évaluation du rapport bénéfice/risque par votre vétérinaire.

### **Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux**

Se laver les mains après usage.

En cas d'ingestion accidentel des comprimés, en particulier par des enfants, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui l'emballage ou la notice.

### **Utilisation en cas de gravidité et de lactation**

Le médicament vétérinaire peut être utilisé chez les chattes reproductrices y compris celles en gestation ou en lactation.

### **Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions**

L'utilisation simultanée du médicament vétérinaire et de selamectine est bien supportée. Aucune interaction n'a été observée lorsque la posologie recommandée pour la lactone macrocyclique selamectine était administrée au cours du traitement dans la dose recommandée.

Bien que non conseillée, l'utilisation simultanée du médicament vétérinaire, à la dose recommandée, avec un spot-on qui contient la moxidectine et l'imidaclopride est bien tolérée après une seule utilisation, selon une étude expérimentale sur 10 chatons. La sécurité et l'efficacité de l'utilisation simultanée n'ont pas été examinées dans des études sur le terrain. Par l'absence d'autres études, il est recommandé d'être prudent lors de l'administration simultanée du médicament vétérinaire avec les autres lactones macrocycliques. De telles études n'ont pas été réalisées non plus sur des animaux gravides.

En raison de l'absence d'autres études, il est recommandé d'agir avec prudence lors de l'administration simultanée du médicament vétérinaire et d'autres lactones macrocycliques. En outre, de telles études n'ont pas été effectuées sur des animaux gravides.

### **Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire**

En cas de surdosage, outre les symptômes observés à la dose recommandée (voir rubrique 6. Effets indésirables), il a été observé que les animaux pouvaient baver. Ce phénomène disparaît normalement spontanément dans un délai d'un jour.

### **13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences nationales.

Le médicament vétérinaire ne doit pas être déversé dans les cours d'eau étant donné car cela pourrait mettre en danger les poissons et autres organismes aquatiques.

### **14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE**

Mars 2016

### **15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Présentations:

Boîte de 2 comprimés sous plaquettes thermoformées

Boîte de 4 comprimés sous plaquettes thermoformées

Boîte de 10 comprimés sous plaquettes thermoformées

Boîte de 20 comprimés sous plaquettes thermoformées

Boîte de 50 comprimés sous plaquettes thermoformées

Boîte de 100 comprimés sous plaquettes thermoformées

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

BE-V253163MILBEMAX Comprimés enrobés pour petits chats et chatons.

BE-V253154MILBEMAX Comprimés enrobés pour chats.

Sur délivrance libre