

MEDICA HALSTABLETTEN MENTHOL, 5mg/1mg, Lutschtabletten, gepresst
Chlorhexidin Hydrochlorid - Lidocain Hydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.



- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
- Wenn Sie sich nach 3 bis 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wass in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Medica Halstabletten Menthol und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Medica Halstabletten Menthol beachten?
3. Wie ist Medica Halstabletten Menthol anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Medica Halstabletten Menthol aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. WAS IST MEDICA HALSTABLETTEN MENTHOL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Medica Halstabletten Menthol ist eine Lutschtablette für örtliche Anwendung in dem Mund und der Rachenhöhle.

Es ist ein Desinfektionsmittel und örtliches schmerzstillendes Mittel.

Medica Halstabletten Menthol ist angezeigt bei:

- Behandlung der Symptome von Halsschmerzen, roter Kehle, Erkrankungen der Rachenhöhle mit Reizungen;
- Im Fall einer bakteriellen Infektion mit Fieber ist eine ergänzende Behandlung erforderlich;
- Medica Halstabletten Menthol enthält keinen Zucker und ist folglich auch für Diabetiker geeignet.

2. WAS SOLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON MEDICA HALSTABLETTEN MENTHOL BEACHTEN?

Medica Halstabletten Menthol darf nicht angewendet werden,

- Wenn Sie allergisch gegen Chlorhexidin Hydrochlorid oder Lidocain Hydrochlorid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von Medica Halstabletten Menthol sind.
- Bei Kindern unter 6 Jahren.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Medica Halstabletten Menthol anwenden.

- Medica Halstabletten Menthol darf nicht langanhaltend, ununterbrochen oder immer wieder verwendet werden. Beschränken Sie den Gebrauch lediglich auf die notwendige Erleichterung von Schmerz und Irritation.
- Wenn eine zu hohe Dosis verwendet wird (mehr als 20 Tabletten pro Tag), besteht ein geringes Risiko zur Verringerung der Kontrolle des Schluckreflexes.
- Bei Kleinkindern, die schon einen Anfall von Konvulsionen gehabt haben. Dieses Arzneimittel enthält nämlich Menthol.
- Wenn Sie noch andere Arzneimittel anwenden. Bitte lesen Sie auch die Rubrik: „Anwendung von Medica Halstabletten Menthol zusammen mit anderen Arzneimitteln“.

Fragen Sie Ihren Arzt, wenn eine der obigen Warnungen auf Sie zutrifft oder dies in der Vergangenheit der Fall war.

Kinder

Dieses Arzneimittel darf nicht bei Kindern unter 6 Jahren angewendet werden.

Anwendung von Medica Halstabletten Menthol zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

- Nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln für leichte Formen von Alzheimer (Cholinesterasehemmern) anwenden.
- Nicht gleichzeitig mit anderen Desinfektionsmitteln anwenden.

Anwendung von Medica Halstabletten Menthol zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wenn Sie die vorangegangenen Vorsichtsmaßnahmen respektiert, können Sie Medica Halstabletten Menthol während der Schwangerschaft und der Stillzeit benutzen. Informieren Sie Ihren Arzt über die Benutzung dieses Arzneimittels.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Medica Halstabletten Menthol enthält Menthol und Sorbitol

Medica Halstabletten Menthol enthält Menthol: Vorsicht bei Kleinkindern, die schon einen Anfall von Konvulsionen gehabt haben.

Medica Halstabletten Menthol enthält Sorbitol. Bitte nehmen Sie Medica Halstabletten Menthol erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Sorbitol kann eine leicht abführende Wirkung haben. Der Kalorienwert beträgt 2,6 kcal/g Sorbitol.

3. WIE IST MEDICA HALSTABLETTEN MENTHOL ANZUWENDEN?

Wenden Sie Medica Halstabletten Menthol immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene: 6 bis 10 Tabletten pro Tag.

Kinder ab 6 Jahren: 3 bis 5 Tabletten pro Tag.

Die Tablette langsam im Mund auflutschen.

Dieses Arzneimittel darf nicht über einen längeren Zeitraum benutzt werden. Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, falls die Symptome verschlimmern oder nicht verbessern nach 3 bis 4 Tagen.

Wenn Sie eine größere Menge von Medica Halstabletten Menthol angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Medica Halstabletten Menthol haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Dieses Arzneimittel enthält lediglich einen Bruchteil einer toxischen Dosis. Bei richtiger Anwendung sind die Risiken auf eine Überdosierung sehr gering.

Symptome einer Überdosierung sind: Ruhelosigkeit, Ohrensausen, Atmungsschwierigkeiten, Herzrhythmusstörungen, Verminderung der Kontrolle des Schluckreflexes.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch Medica Halstabletten Menthol Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Sehr selten: allergische Haut- und Schleimhautreaktionen.
- Es kann zu Geschmacksstörungen, Brandgefühl auf der Zunge und ernstliche allergische Reaktionen (anaphylaktischen Reaktionen) kommen.
- Bei langanhaltender, ununterbrochener Anwendung kann eine Braunverfärbung der Zähne auftreten. Diese Verfärbung ist jedoch leicht zu entfernen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

5. WIE IST MEDICA HALSTABLETTEN MENTHOL AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Nicht über 25°C lagern. Sie dürfen Medica Halstabletten Menthol nach dem auf der Schachtel/der Blisterpackung nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Die ersten beiden Ziffern geben den Monat, die folgenden zwei oder vier Ziffern das Jahr an. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN.

Was Medica Halstabletten Menthol enthält

- Die Wirkstoffe sind: Chlorhexidin Hydrochlorid 5 mg - Lidocain Hydrochlorid 1 mg.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Sorbitol – Magnesiumstearat – Zitronensäure, wasserfrei – Menthol.

Wie Medica Halstabletten Menthol aussieht und Inhalt der Packung

Packung mit 40 Lutschtabletten, gepresst in Blisterpackung und Packung mit 36 Lutschtabletten, gepresst in Folienstreifen.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgien

Zulassungsnummer: BE172435

Art der Abgabe

Freie Abgabe.

Im selben Sortiment gibt es auch:

MEDICA HALSTABLETTEN LEMON, 5 mg/1 mg, Lutschtabletten, gepresst:

Desinfektionsmittel und örtliches schmerzstillendes Mittel für Mund und Rachenhöhle

MEDICA HALSSPRAY MENTHOL, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle: Desinfektionsmittel und örtliches schmerzstillendes Mittel für Mund und Rachenhöhle

MEDICA HALSSPRAY LEMON, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle: Desinfektionsmittel und örtliches schmerzstillendes Mittel für Mund und Rachenhöhle

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 11/2012.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 11/2012