

**GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

Livostin 0,5 mg/ml Augentropfensuspension

Levocabastin

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Livostin jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der unter Abschnitt 4 aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet**

1. Was ist Livostin und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Livostin beachten?
3. Wie ist Livostin anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Livostin aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

**1. WAS IST LIVOSTIN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Livostin ist ein Arzneimittel gegen allergische Augenbeschwerden.

Livostin Augentropfen sind angezeigt zur schnellen und lang anhaltenden Linderung von Augenentzündungen infolge einer Überempfindlichkeit, wie bei Heuschnupfen. Diese Symptome können in bestimmten Jahreszeiten, aber auch während des ganzen Jahres auftreten.

**2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON LIVOSTIN BEACHTEN ?**

**Livostin darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen einen der Bestandteile der Augentropfen sind. Diese Bestandteile finden Sie unter Punkt 6. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker vor der Anwendung.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Livostin ist erforderlich**

- Livostin darf nur bei Augenentzündungen infolge einer Allergie (Überempfindlichkeit), jedoch nicht bei sonstigen Augenentzündungen bzw. -erkrankungen benutzt werden.
- Wenn Sie eine Nierenkrankheit haben, dürfen Sie Livostin Augentropfen nicht langfristig anwenden, da das Arzneimittel vor allem über die Nieren ausgeschieden wird.
- Sie dürfen Livostin Augentropfen ebenfalls nicht anwenden, wenn Sie weiche Kontaktlinsen tragen.

Nach der Verabreichung der Augentropfen sind folgende Maßnahmen nützlich, um die Aufnahme in den Blutkreislauf zu verringern:

- Augenlid 2 Minuten lang geschlossen halten;
- Tränenkanal mit dem Finger 2 Minuten lang zudrücken.

**Bei Anwendung von Livostin mit anderen Arzneimitteln**

Es liegen keine hinreichenden Daten über die möglichen Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln, die im Auge zu verabreichen sind, vor. Sie sollten dieses Arzneimittel daher vorzugsweise nicht in Kombination mit solchen Mitteln anwenden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Anwendung von Livostin zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Keine Besonderheiten.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine hinreichenden Daten für die Verwendung von Livostin bei Schwangeren vor. Ihr Arzt oder Apotheker wird entscheiden, ob Sie die Augentropfen während Ihrer Schwangerschaft anwenden dürfen.

Sie dürfen die Augentropfen während der Stillzeit nicht benutzen, ohne dies zuvor mit Ihrem Arzt besprochen zu haben.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Livostin Augentropfen verursachen keine Schläfrigkeit und vermindern nicht das Reaktionsvermögen und die Reaktionsgeschwindigkeit. Sie können die Augentropfen anwenden, wenn Sie ein Fahrzeug lenken oder Maschinen bedienen.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Livostin**

Livostin Augentropfen enthalten Benzalkoniumchlorid und Propylenglycol. Vermeiden Sie den Kontakt mit weichen Kontaktlinsen, da dies zu Augenreizung führen kann. Nehmen Sie die Kontaktlinsen vor der Verabreichung der Augentropfen heraus und warten Sie mindestens 15 Minuten, bevor Sie sie wieder einlegen. Weiche Kontaktlinsen können sich verfärben.

**3. WIE IST LIVOSTIN ANZUWENDEN?**

Wenden Sie Livostin genau nach Anweisung der Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

*Erwachsene und Kinder:*

Die übliche Dosierung beträgt 1 Tropfen Livostin pro Auge, 2 Mal täglich.

Bei starken Beschwerden können Sie 3 bis 4 Mal täglich 1 Tropfen in jedes Auge einträufeln.

Drehen Sie die Flasche um und träufeln Sie jeweils 1 Tropfen direkt in den äußeren Augenwinkel.

Das Tropffläschchen vor jeder Anwendung gut schütteln!

Sie dürfen die Augentropfen nicht länger als 1 Monat nach Anbruch des Tropffläschchens verwenden. Aus hygienischen Gründen ist jeder Kontakt zwischen der Flasche und dem Auge zu vermeiden.

**Wenn Sie eine größere Menge von Livostin angewendet haben, als Sie sollten**

Es treten keine Vergiftungserscheinungen auf, wenn Sie zu viel Livostin Augentropfen in die Augen eingeträufelt haben.

Bei versehentlicher Einnahme und Schlucken des Flascheninhalts könnten Sie sich schläfrig fühlen. In diesem Fall müssen Sie viel nicht alkoholische Getränke trinken, damit das Arzneimittel schneller über die Nieren ausgeschieden wird.

Wenn Sie zu viel Livostin angewendet oder das Produkt eingenommen haben, nehmen Sie sofort Kontakt auf mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder dem Antigiftzentrum (070.245.245).

**Wenn Sie die Anwendung von Livostin vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

### **Wenn Sie die Anwendung von Livostin abbrechen**

Keine Besonderheiten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Livostin Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Anwendung von Livostin können die folgenden bedeutenden Nebenwirkungen auftreten: Schwellung des Auges, Schwellung des Augenlides, Blutansammlung im Auge, eine besondere Form der allergischen Reaktion, gekennzeichnet durch Schwellung von Lippen, Zunge und Augenlidern, Nesselsucht und Kurzatmigkeit (angioneurotisches Ödem) und Überempfindlichkeit. Wenn bei Ihnen eine dieser Nebenwirkungen auftritt, sollten Sie die Behandlung abbrechen und Ihren Arzt oder Apotheker um Rat fragen.

Nebenwirkungen, die häufig auftreten (bei 1 bis 10 von 100 Anwendern), sind:

- Augenschmerzen
- verschwommene Sicht.

Nebenwirkungen, die sehr selten auftreten (bei weniger als 1 von 10.000 Anwendern), sind:

- Kopfschmerzen

Nebenwirkungen mit Frequenz nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

- Bindehautentzündung, Entzündung der Augenlider, wässrige Augen
- Reizung der mit dem Arzneimittel in Kontakt geratenen Haut, Nesselsucht,
- Reaktion am Anwendungsort, wie Brennen, Rötung, Reizung, Schmerz, Schwellung, juckende Augen oder verschwommene Sicht.

Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **5. WIE IST LIVOSTIN AUFZUBEWAHREN?**

Livostin Augentropfen sind bei Zimmertemperatur (15–25°C) aufzubewahren. Zur Infektionsvorbeugung muss die Tropffläschchen nach jeder Anwendung gut verschlossen werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen Livostin nach dem auf dem Umkarton nach „Exp.“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats (die ersten zwei Zahlen geben den Monat an, die letzten das Jahr).

Spülen Sie Arzneimittel nicht durch das Spülbecken oder die Toilette und geben Sie sie nicht zum Hausmüll. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Sie Ihre Arzneimittel entsorgen können, wenn diese nicht mehr benötigt werden. Sie werden dann ordnungsgemäß vernichtet und gelangen nicht in die Umwelt.

## **6. WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Livostin enthält:**

- Der Wirkstoff in Livostin ist Levocabastinhydrochlorid. Jedes ml enthält 0,5 mg Levocabastin. 1 ml entspricht 33 Tropfen, wobei jeder Tropfen 0,015 mg Levocabastin enthält.
- Die sonstigen Stoffe in Livostin sind: 0,295 mg/ml einer 50%igen Lösung Benzalkoniumchlorid als Konservierungsmittel, Propylenglykol, Polysorbat 80, Dinatriummonohydrogenphosphat wasserfrei, Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, Dinatriumedetat, Hypromellose 2910 3000 mPa.s und Wasser für Injektionszwecke.

### **Wie Livostin aussieht und Inhalt der Packung**

Tropffläschchen mit 4 ml Augentropfensuspension.

### **Abgabe**

Belgien: Livostin Augentropfen sind ohne Verschreibung erhältlich.

Luxemburg: Livostin Augentropfen sind rezeptpflichtig.

### **Pharmazeutischer Unternehmer**

Johnson & Johnson Consumer NV/SA

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse, Belgien

**Hersteller**

Famar S.A.  
Agiou Dimitriou 63  
Alimos Attiki  
17456  
Griechenland

Und

Johnson & Johnson Consumer NV/SA  
Antwerpseweg 15-17  
B- 2340 Beerse

**Zulassungsnummer**

BE 154533

**Diese Gebrauchsgenehmigung wurde zuletzt genehmigt in 05/2016**