

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER**ECHINACIN LIQUIDUM Lösung zum Einnehmen**

Echinacea purpurea (L) Moench

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Echinacin Liquidum und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Echinacin Liquidum beachten?
3. Wie ist Echinacin Liquidum einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Echinacin Liquidum aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST ECHINACIN LIQUIDUM UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Echinacin Liquidum ist bei der symptomatischen Behandlung von Infektionen der oberen Atemwege angezeigt, nachdem schwere Erkrankungen ausgeschlossen wurden.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON ECHINACIN LIQUIDUM BEACHTEN?

Echinacin Liquidum darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Echinacea purpurea oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei fortschreitender Krankheit wie z. B. Tuberkulose, bei abnormaler Erhöhung der Anzahl der weißen Blutkörperchen, bei Gewebskrankheiten, bei multipler Sklerose, bei Aids und den damit auftretenden Infektionen, bei Autoimmunerkrankungen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Echinacin Liquidum einnehmen.

Wenn Sie bereits andere Arzneimittel anwenden, lesen Sie auch den Abschnitt „Einnahme von Echinacin Liquidum zusammen mit anderen Arzneimitteln“.

Keine längere Anwendung ohne ärztlichen Rat.

Einnahme von Echinacin Liquidum zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Da keine Informationen bzgl. einer eventuellen Interaktion bei einer allergischen Desensibilisierungsbehandlung bestehen, soll Echinacin Liquidum während einer solchen Behandlung nicht verwendet werden.

Da Echinacin Liquidum Alkohol enthält, kann bei gleichzeitiger Einnahme bestimmter Arzneimittel eine DISULFIRAM-Wirkung auftreten (unangenehme Reaktion nach Alkoholkonsum, die sich in Hitzewallungen, Erbrechen und manchmal einem niedrigen Blutdruck äußert).

Einnahme von Echinacin Liquidum zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Alkoholismus ist eine relative Kontraindikation.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Vorsichtshalber und angesichts der fehlenden Daten zu diesem Thema darf dieses Medikament während Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

In den verschriebenen Dosen beeinflusst die Menge Alkohol, die resorbiert wird, normalerweise nicht die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen.

Man muss beachten, dass eine Flasche Echinacin Liquidum eine Alkoholmenge enthält, die einen negativen Einfluss bei der Bedienung von Maschinen und Fahrzeuge haben kann, wenn die gesamte Menge auf einmal eingenommen wird.

Echinacin Liquidum enthält 22 Vol.-% Ethanol (Alkohol), d. h. bis zu 440 mg pro Dosis, entsprechend 11 ml Bier, 4,6 ml Wein pro Dosis.

Gesundheitliches Risiko für Patienten, die an Alkoholismus leiden.

Dies ist bei schwangeren bzw. stillenden Frauen sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

3. WIE IST ECHINACIN LIQUIDUM EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wenn keine Besserung eintritt, fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene

- Am ersten Tag: Die Anfangsdosis ist 2,5 ml. Danach und für den Rest des Tages 1,25 ml alle 2 Stunden.
- Ab dem zweiten Tag 2,5 ml 3-mal täglich.

Die Höchstdosis beträgt 15 ml pro Tag.

Anwendung bei Kindern

Kinder von 2 - 12 Jahren:

1 Tropfen pro kg Körpergewicht täglich verteilt auf 3 Tagesgaben.

Kinder unter 2 Jahren:
Nur auf ärztlichen Rat

Echinacin Liquidum sollte mit etwas Flüssigkeit verdünnt werden.

Eine Langzeitbehandlung bringt keinen zusätzlichen Behandlungserfolg. Die max. ununterbrochene Behandlungszeit liegt bei 2 Wochen.

Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, wie lange Sie Echinacin Liquidum einnehmen müssen. Brechen Sie die Behandlung nicht vorzeitig ab.

Wenn Sie eine größere Menge von Echinacin Liquidum eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Echinacin Liquidum eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Bisher ist kein Fall einer Vergiftung bei Überdosierung bekannt.

Bei Überdosierung ist die Einnahme des Medikamentes einzustellen.

Wenn Sie die Einnahme von Echinacin Liquidum vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Echinacin Liquidum abbrechen

Entfällt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In sehr seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Bei Zubereitungen, die Echinacea enthalten, wurden Fälle von Hautausschlag, Juckreiz, selten Schwellungen im Gesicht, Atemschwierigkeiten, Schwindel und Blutunterdruck gemeldet.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über die Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, Abteilung Vigilanz EUROSTATION II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 BRÜSSEL anzeigen.

Website: www.fagg-afmps.be

E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST ECHINACIN LIQUIDUM AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Im geschlossenen Fläschchen bei Zimmertemperatur zwischen +15 °C und +25 °C und vor Licht geschützt aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett, dem Umkarton, dem Behältnis nach „EXP.“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Echinacin Liquidum enthält

- Der Wirkstoff ist: Saft der Echinacea purpurea-Pflanze (L) Moench
- Der sonstige Bestandteil ist: Alkohol 96 Vol.-%

Wie Echinacin Liquidum aussieht und Inhalt der Packung

Glasflasche mit 50 ml und 100 ml Lösung zum Einnehmen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Meda Pharma s.a.
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Brüssel
Belgien

Hersteller

Madaus GmbH, D-51101 Köln; Deutschland

Zulassungsnummer

BE 211233

Abgabeform

Frei verkäuflich

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 01/2016.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 03/2016