

DENOMINATION DU MEDICAMENT

EUPHON Pastilles



COMPOSITION

Sisymbrium officinale Scop. (Erysimum) 10 mg (extrait sec aqueux sur maltodextrine – 6 parties de plante pour 1 partie d'extrait)

Excipients : arôme orange, arôme mandarine, rouge cochenille A, gomme arabique, saccharose, sucre inverti, glucose liquide pour une pastille de 1 gramme.

FORME PHARMACEUTIQUE, CONDITIONNEMENT

Voie orale.
50 ou 70 pastilles à sucer.

CATEGORIE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antitussif à base de plantes par voie générale.
Effet antalgique de la sphère oropharyngée par la voie locale.

TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT ET FABRICANT

Titulaire : SC d'APPLICATIONS CHIMIQUES ET PHYTOPHÉRAPEUTIQUES
Rue du cours d'Eau, 10
B-1428 Lillois

Fabricant : Laboratoires Mayoly Spindler
6 Avenue de l'Europe
F -78401 Chatou Cedex

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

EUPHON Pastilles est un médicament à base de plante, utilisé pour soulager la toux après que toute maladie grave ait été écartée.
ATTENTION : si la toux persiste plus de sept jours sans amélioration de la condition, consulter un médecin.

CAS OU L'USAGE DU MEDICAMENT DOIT ETRE EVITE

Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 6 ans.
Hypersensibilité à l'un des constituants de la préparation.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Pas d'utilisation prolongée sans avis médical.

Chaque pastille à sucer contient les quantités de sucre suivantes :

Saccharose : 425 mg

Sucre inverti : 75 mg

Glucose : 100 mg

UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

On ne connaît pas de contre-indication à l'administration de Euphon pastilles pendant la grossesse ou l'allaitement.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale

Adultes : 10 à 12 pastilles par jour

Enfants à partir de 6 ans : 5 à 6 pastilles par jour

A laisser fondre dans la bouche.

MESURES EN CAS D'UTILISATION DE TROP FORTES DOSES

Prévenir votre médecin ou votre pharmacien

N° de téléphone du centre Anti-poisons : 070/245.245

En cas de surdosage, un traitement symptomatique s'impose.

EFFETS NON DESIRES

Tout effet apparaissant au cours du traitement et non décrit dans la notice doit être signalé au pharmacien ou au médecin traitant.

STABILITE-CONSERVATION

Stabilité : il y a lieu de se référer à la date de péremption figurant sur l'emballage en regard du sigle « EX » suivi de 4 chiffres : les deux premiers chiffres représentent le premier jour du mois, les deux derniers chiffres, l'année au cours de laquelle le produit est périmé.

Conserver à la température de la pièce (15°C – 25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière.

DATE DE LA DERNIERE MISE A JOUR DE LA NOTICE

Septembre 2010

