

## L8, solution buvable en gouttes

Benzoicum acidum 2 DH, Apocynum cannabinum 8 DH, Ononis spinosa 2 DH, Colchicum 4 DH, Solidago TM, Berberis TM, Coccus cacti 3 DH, Hexaminum 3 DH, Herniaria glabra 3 DH, Belladonna 3 DH,

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.**

**Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

- Attention : si les troubles persistent, consultez un médecin.

### 1 - QU'EST-CE QUE L8, solution buvable en gouttes ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

L8, solution buvable en gouttes est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les cystalgies et dans les oliguries. Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en gouttes en flacon de 30 ml (environ 1 200 gouttes).

### 2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER L8, solution buvable en gouttes ?

#### Précautions particulières :

Ce produit contient au maximum 45% (V/V) d'éthanol. 20 gouttes contiennent 178 mg d'éthanol, équivalent à 4,49 ml de bière (env. 0,45 cl) ou 1,87 ml de vin (env. 0,19 cl).

En raison de la présence d'éthanol, ce médicament est dangereux pour les personnes souffrant d'alcoolisme. La présence d'éthanol doit également être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants et les personnes à risque, par exemple chez les personnes souffrant d'une maladie du foie ou d'épilepsie.

#### Aliments et boissons :

Ce médicament est à prendre de préférence à distance des repas.

#### Grossesse et allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Liste des excipients à effet notoire :

Éthanol.

#### Utilisation d'autres médicaments :

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

### 3 - COMMENT UTILISER L8, solution buvable en gouttes ?

En l'absence de prescription particulière de votre médecin, la posologie est de :

Adultes : Traitement de fond : 20 gouttes, 3 fois par jour.

Voie orale.

A prendre dans un peu d'eau,

de préférence en dehors des repas.

Cystalgies aiguës : 1 à 2 prises supplémentaires par jour, au moment des crises.

Enfants : selon avis médical.



TENIR LE FLACON  
VERTICALEMENT

**Si vous avez pris plus de L8, solution buvable en gouttes que vous n'auriez dû :** Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre L8, solution buvable en gouttes :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

### 4 - QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, L8, solution buvable en gouttes est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5 - COMMENT CONSERVER L8, solution buvable en gouttes ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Tenir le flacon soigneusement fermé.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Conserver à une température inférieure à 25°C.

#### Les substances actives sont :

Benzoicum acidum	2 DH,
Apocynum cannabinum	8 DH,
Ononis spinosa	2 DH,
Colchicum	4 DH,
Solidago	TM,
Berberis	TM,
Coccus cacti	3 DH,
Hexaminum	3 DH,
Herniaria glabra	3 DH,
Belladonna	3 DH,
p.e.q.s.p.	30 ml.

#### Les autres composants sont :

Éthanol, eau purifiée.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / Fabricant :**

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France.



Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



622 035-03

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France