

Hylo®-Gel

PHARMA MEDICA

Dispositif médical

Composition

1 ml de collyre contient:

Principe actif: hyaluronate de sodium 2 mg.

Excipients: tampon citrate, sorbitol, eau.

Hylo-Gel ne contient pas d'agent conservateur.

Indications/Possibilités d'emploi

Humidification intensive et thérapeutique de la surface de l'oeil lors de sensations de sécheresse oculaire fortes et chroniques ou après une opération aux yeux.

Posologie/Mode d'emploi

Instiller généralement 1 goutte 3 fois par jour dans le sac conjonctival de chaque oeil. En cas de troubles plus marqués, Hylo-Gel peut être utilisé plus souvent. La durée d'utilisation d'Hylo-Gel n'est pas limitée.

Contre-indications

Hypersensibilité à l'un des composants.

Mises en garde et précautions

En cas d'application d'un autre traitement médicamenteux sous forme de collyre, il faut respecter un intervalle de temps d'au moins 30 minutes entre les différentes applications et Hylo-Gel doit toujours être administré en dernier. Les pommades ophtalmiques doivent toujours être appliquées dans le sac conjonctival après Hylo-Gel.

Effets indésirables

Dans de rares cas, des réactions d'hypersensibilité ont été observées (brûlures, larmes), mais elles disparaissent aussitôt après l'arrêt du traitement.

Propriétés/Effets

Hylo-Gel contient du hyaluronate de sodium, une substance naturelle qui est présente dans l'oeil, mais également dans le reste du corps. Ce constituant a la propriété physique spécifique de former un film humide régulier, stable et adhérent particulièrement longtemps à la surface de l'oeil. Hylo-Gel a une teneur en hyaluronate de sodium élevée, ce qui lui confère une haute viscosité. L'oeil est ainsi doté d'un film humide stable et durable. Les troubles persistants ou plus importants sont apaisés et l'oeil est protégé durablement contre les irritations.

Remarques particulières

Garder à température ambiante.

Hylo-Gel peut être utilisé durant 6 mois après ouverture.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Maintenir hors de portée des enfants.

Fabricant

Ursapharm, Industriestr., D-66129 Saarbrücken.

Distribution

Pharma Medica AG, Frohheimstr. 2, 9325 Roggwil TG.



Mise à jour de l'information

Octobre 2010.

Présentation

	Quantité	CHF	Cat. de remise	Cat. de remboursement
HYLO-GEL gtt opht 0.2 %	flacon 10 ml		CE	
	2 x 10 ml		CE	

Publié le 19.04.2012