

Notice : information de l'utilisateur
Corsodyl 10mg/g, gel dentaire
digluconate de chlorhexidine

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?:

1. Qu'est-ce que Corsodyl gel dentaire et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Corsodyl gel dentaire
3. Comment utiliser Corsodyl gel dentaire
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Corsodyl gel dentaire
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Corsodyl gel dentaire et dans quel cas est-il utilisé ?

- Corsodyl gel dentaire contient de la digluconate de chlorhexidine. Cette substance tue la plupart des bactéries et également certains champignons.
- Corsodyl gel dentaire est utilisé
 - dans le traitement des inflammations de la gencive.
 - après une intervention parodontale pour favoriser la guérison de la gencive.
 - pour le traitement d'ulcères récurrents et d'infections buccales causées par *Candida* (par ex. stomatites et aphtes).
 - pour la prévention des caries, lorsque les méthodes conventionnelles sont insuffisantes. Il est nécessaire d'en traiter simultanément la cause sous-jacente.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Corsodyl gel dentaire ?

N'utilisez jamais Corsodyl gel dentaire

- si vous êtes allergique aux digluconate de chlorhexidine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Corsodyl gel dentaire.

- Utilisez ce produit uniquement dans la bouche.
- Eviter tout contact du Corsodyl gel dentaire avec les yeux et les oreilles. Si le gel entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Bien qu'aucun effet négatif n'ait été établi lors de l'ingestion, le Corsodyl gel dentaire ne doit pas être avalé. Son utilisation chez les petits enfants est par conséquent déconseillée.
- L'arrêt du traitement et consultation d'un médecin ou d'un pharmacien s'impose en cas de réaction allergique (en cas de douleur, de gonflement ou d'irritation de la bouche).

Enfants

Les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas utiliser le produit sauf sur recommandation d'un médecin ou d'un pharmacien.

Autres médicaments et Corsodyl gel dentaire

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Il n'existe pas d'indication attestant que l'utilisation simultanée du Corsodyl gel dentaire et d'autres médicaments risque d'entraîner des problèmes.

Corsodyl gel dentaire avec des aliments et boissons

La consommation simultanée de Corsodyl avec d'aliments colorants, tels que le thé, le vin et le café, peut entraîner une coloration brunâtre de la langue et des dents (voir aussi « Effets indésirables éventuels »). La coloration de la langue disparaît après l'arrêt du traitement. La coloration des dents peut être largement évitée en se brossant les dents avec un dentifrice ordinaire et en rinçant la bouche à l'eau avant d'utiliser Corsodyl gel dentaire et en réduisant la consommation d'aliments colorants. Si l'utilisation d'un dentifrice est insuffisante ou impossible, le détartrage ou le polissage des dents peut être utile.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Si les instructions d'utilisation sont respectées, Corsodyl peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Corsodyl gel dentaire n'a pas d'effet sur la capacité de conduire un véhicule ou d'opérer des machines car il n'y a pas d'absorption par le corps (même s'il est avalé accidentellement).

3. Comment utiliser Corsodyl gel dentaire ?

Veillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin ne vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Étant donné que bon nombre de dentifrices ordinaires contiennent des substances ne pouvant être utilisées avec Corsodyl, vous devez, après le brossage des dents, vous rincer la bouche avant d'utiliser Corsodyl.

Pour le traitement des problèmes de gencives;

Se brosser les dents 2 fois par jour pendant 2 semaines avec 2,5 cm de Corsodyl gel dentaire déposés sur la brosse, pendant une durée d'au moins 1 minute ou suivez l'avis du médecin ou du dentiste.

Pour le traitement des aphtes;

À l'aide de l'index, appliquez deux fois par jour 2,5 cm de Corsodyl gel dentaire sur et autour des aphtes.

Afin de prévenir des caries dentaires;

Une gouttière préformée et adaptée aux dents sera fabriquée par le dentiste. Placer 2,5 cm de Corsodyl gel dentaire dans la gouttière et appliquer quotidiennement sur les dents, de préférence le soir, en maintenant pendant 5 minutes. Utilisez le produit pendant 2 semaines et répétez éventuellement le traitement après 3 à 4 mois.

Simultanément, d'autres mesures préventives doivent être prises, comme la diminution de l'utilisation de sucre et le brossage des dents deux fois par jour à l'aide d'un dentifrice au fluor.

En cas de traitement de la stomatite par Candida sous la prothèse dentaire;

Appliquer environ 2 cm de Corsodyl gel dentaire au niveau de l'intrados de la prothèse complète. Garder la prothèse en bouche pendant 10 minutes, puis se rincer la bouche et nettoyer la prothèse.

Si vous avez utilisé plus de Corsodyl gel dentaire que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé ou pris trop de Corsodyl gel dentaire, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Anti-Poison (070/245-245).

Si vous oubliez d'utiliser Corsodyl gel dentaire

Si vous avez oublié d'utiliser Corsodyl gel dentaire, veuillez utiliser Corsodyl gel dentaire et poursuivre le traitement comme précisé dans la section « Comment utiliser Corsodyl gel dentaire ».

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Réactions allergiques

- Arrêtez d'utiliser Corsodyl gel dentaire et consultez immédiatement un médecin si vous souffrez des éruptions cutanées (urticaire), gonflement des lèvres, la langue, la gorge ou du visage ou si vous avez des difficultés à respirer (dyspnée). Ces effets peuvent être des symptômes d'une réaction allergique grave qui est très rare.

Cavité buccale

- Au début du traitement, une perturbation du goût peut être éprouvée, ainsi qu'une sensation de brûlure de la langue. Ces symptômes disparaissent le plus souvent si l'on poursuit le traitement. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin ou pharmacien.
- L'utilisation fréquente peut entraîner une coloration brunâtre de la langue et des dents (y compris des obturations et des prothèses). Consultez la rubrique 2 " Corsodyl gel dentaire avec des aliments et des boissons" pour savoir comment l'éviter.

Peau

- Irritations cutanées

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Belgique Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance Boîte Postale 97 B-1000 Bruxelles Madou Site internet: www.fagg-afmps.be E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be	Luxembourg Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy crpv@chru-nancy.fr Tél. : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 Fax : (+33) 3 83 65 61 33 ou Division de la Pharmacie et des Médicaments, Direction de la santé à Luxembourg pharmacovigilance@ms.etat.lu Tél. : (+352) 247-85592 Fax : (+352) 247-95615
--	---

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Corsodyl gel dentaire

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas les 25°C .

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Corsodyl gel dentaire

- La substance active est la digluconate de chlorhexidine.
- Les autres composants: huile de menthe poivrée, levomenthol, polyoxyl hydrogenated castor oil (=PEG-40 huile de ricin hydrogénée), alcool isopropylique, acétate de sodium, hydroxypropylcellulose et eau purifiée.

Aspect de Corsodyl gel dentaire et contenu de l'emballage extérieur

- Corsodyl gel dentaire est un gel transparent.
- Corsodyl gel dentaire est disponible en tube de 50g de gel.

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.
Site Apollo
Avenue Pascal, 2- 4- 6
1300 Wavre

Fabricant:

Purna Pharmaceuticals nv,
Rijksweg 17,
2870 Puurs,
Belgique

Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché:

Corsodyl 10mg/g, gel dentaire: BE104973

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est

Date d'approbation : 08/2020