
NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



RENNIE MINT 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer
RENNIE MINT SANS SUCRE 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer
RENNIE COOL MINT 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer
RENNIE COOL MINT SANS SUCRE 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer

Carbonate de calcium et sous-carbonate de magnésium

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours l'utiliser avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Rennie et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Rennie
3. Comment prendre Rennie
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Rennie
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE RENNIE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Rennie est un médicament qui soulage les sensations de brûlures au niveau de l'estomac. Il est utilisé pour soulager les douleurs gastriques telles que :

- sensation de brûlure
- remontées acides
- sensation de ballonnement au niveau de l'estomac.

Les personnes présentant une hypersensibilité au sucre, notamment les patients diabétiques, doivent utiliser Rennie sans sucre comprimés à croquer.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER RENNIE ?

N'utilisez jamais Rennie :

- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si votre taux de calcium dans le sang est anormalement élevé.
- en cas de diminution sévère de la fonction rénale.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Rennie.

Faites particulièrement attention lors de l'utilisation de Rennie dans les circonstances suivantes :

- si vous désirez utiliser ce médicament pendant une longue période. Dans ce cas, discutez-en toujours avec votre médecin.
- si vous êtes hypersensible au sucre, en particulier si vous êtes diabétique. Si cette mise en garde s'applique à votre cas, utilisez Rennie sans sucre comprimés à croquer.
- si vous avez des problèmes rénaux. Discutez-en avec votre médecin avant d'utiliser Rennie. Il se peut que vous deviez subir des examens médicaux.

Autres médicaments et Rennie

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament. Cela s'applique également aux médicaments obtenus sans ordonnance.

Dans certains cas, vous ne devez pas prendre Rennie en même temps que les médicaments ci-dessous, car il faut respecter un intervalle de 2 heures entre la prise de ces médicaments et celle de Rennie :

- Tétracyclines (un type d'antibiotique)
 - Cimétidine (inhibe la production d'acide gastrique)
- Préparations à base de fer
- Chlorpromazine (un antipsychotique)
- Quinolones (un type d'antibiotique)
- Etidronate (pour le traitement de l'ostéoporose et des douleurs osseuses)
- Alendronate (pour le traitement de l'ostéoporose et des douleurs osseuses)
- Indométacine (pour diminuer la fièvre et la douleur)
- Glycosides cardiaques (pour traiter les problèmes cardiaques)

Si vous utilisez des **diurétiques** (médicaments destinés à augmenter la production d'urine) et prenez simultanément des doses élevées de Rennie, cela peut entraîner des anomalies du taux de calcium dans le sang.

Rennie avec des aliments et boissons

On peut observer un taux de calcium anormal dans le sang en cas de prise prolongée et simultanée de vitamine D ou de produits laitiers et de doses élevées de Rennie.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Les comprimés à croquer peuvent être prises durant la grossesse et l'allaitement. Il n'y a pas de danger pour l'enfant à naître ni pour le bébé si les recommandations fournies dans cette notice à la rubrique « Comment prendre Rennie ? » sont suivies (maximum 8 comprimés à croquer par jour, et jamais plus de quelques jours).

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

Rennie contient du saccharose

- Rennie Mint et Rennie Cool Mint comprimés à croquer contiennent du **saccharose**. Les patients souffrant de malabsorption du glucose et du galactose, d'intolérance au fructose ou de déficience en sucrase ne peuvent pas utiliser ces médicaments.
- Les comprimés à croquer Rennie ne contiennent pratiquement pas de **sodium (sel)** et peuvent donc être utilisées par les personnes qui suivent un régime sans sel.

3. COMMENT PRENDRE RENNIE

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Les comprimés à croquer se prennent sans eau, elles se sucent dès l'apparition des premiers symptômes d'excès d'acidité gastrique (hyperacidité).
- Sucrer 1 ou 2 comprimés à croquer, répéter si nécessaire.
- Pour un soulagement rapide de l'inconfort, croquer la première comprimé à croquer.
- Ne jamais prendre plus de 8 comprimés à croquer par jour, et jamais plus de quelques jours (voir Effets indésirables éventuels).

Si vous avez utilisé plus de Rennie que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus que la dose recommandée, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245). Buvez beaucoup. Si le médicament a été pris récemment, votre estomac pourra être vidé (lavage gastrique).

Un surdosage de Rennie peut provoquer un taux de calcium anormal dans le sang. Les symptômes englobent : troubles digestifs, fatigue anormale, confusion, dépression, augmentation des quantités d'urine, soif excessive et déshydratation.

Si vous oubliez de prendre Rennie

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Rennie

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Le carbonate de calcium (une des substances actives de ce médicament) peut provoquer de la constipation. Cet effet indésirable est cependant contrecarré par la présence de carbonate de magnésium (l'autre substance active de ce médicament), qui a une action laxative.

On a rarement observé la survenue de réactions allergiques (réactions d'hypersensibilité).

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5. COMMENT CONSERVER RENNIE

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

RENNIE MINT 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer

Rouleau : à conserver à une température ne dépassant pas 25°C, dans l'emballage d'origine.

RENNIE MINT SANS SUCRE 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer

Plaquettes: à conserver à une température ne dépassant pas 25°C et à l'abri de l'humidité.

RENNIE COOL MINT 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer

Plaquettes: à conserver à une température ne dépassant pas 25°C et dans l'emballage d'origine.

RENNIE COOL MINT SANS SUCRE 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer

Plaquettes: à conserver à une température ne dépassant pas 25°C et à l'abri de l'humidité.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EX. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Rennie

RENNIE MINT 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer

- Les substances actives sont: carbonate de calcium 680 mg, sous-carbonate de magnésium 80 mg
- Les autres composants sont : saccharose, amidon de pomme de terre, amidon de maïs pré-gélatinisé, stéarate de magnésium, talc, paraffine liquide, huile de menthe, huile de citron, eau purifiée

RENNIE MINT SANS SUCRE 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer

- Les substances actives sont : carbonate de calcium 680 mg, sous-carbonate de magnésium 80 mg
- Les autres composants sont : sorbitol, talc, amidon de pomme de terre, amidon de maïs pré-gélatinisé, stéarate de magnésium, paraffine liquide, arôme menthe, saccharine sodique

RENNIE COOL MINT 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer

- Les substances actives sont : carbonate de calcium 680 mg, sous-carbonate de magnésium 80 mg
- Les autres composants sont : saccharose, amidon de pomme de terre, amidon de maïs pré-gélatinisé, stéarate de magnésium, talc, paraffine liquide, huile de menthe, xylitab 100, Aroma refrigerandum

RENNIE COOL MINT SANS SUCRE 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer

- Les substances actives sont : carbonate de calcium 680 mg, carbonate de magnésium 80 mg
- Les autres composants sont : sorbitol, amidon de maïs pré-gélatinisé, amidon de pomme de terre, talc, stéarate de magnésium, paraffine liquide légère, *Aroma refrigerandum*, arôme menthe, saccharine sodique

Aspect de Rennie et contenu de l'emballage extérieur

Comprimés à croquer.

RENNIE MINT 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer :

boîte de 3 x 12 comprimés à croquer en rouleau.

RENNIE MINT SANS SUCRE 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer :
boîtes de 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 et 120 comprimés à croquer en plaquettes.

RENNIE COOL MINT 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer :
boîtes de 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 et 120 comprimés à croquer en plaquettes.

RENNIE COOL MINT SANS SUCRE 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer :
boîtes de 36 comprimés à croquer en plaquettes

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Bayer SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14, B-1831 Diegem (Machelen), BELGIQUE

Fabricant :

Delpharm Gaillard - Rue de l'Industrie, 33 - F-74240 Gaillard, FRANCE

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché

RENNIE MINT 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer :
BE250871

RENNIE MINT SANS SUCRE 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer :
BE141267

RENNIE COOL MINT 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer :
BE119375



RENNIE COOL MINT SANS SUCRE 680 mg / 80 mg, comprimés à croquer :
BE263173

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 02/2014