

Fenistil® Gel



Novartis Consumer Health Schweiz AG

OEMéd

Qu'est-ce que Fenistil gel et quand est-il utilisé?

Fenistil gel s'oppose à l'action de l'histamine, une des substances libérées lors de réactions allergiques.

Appliquée sur la peau, cette spécialité calme les démangeaisons causées par de telles réactions. Fenistil gel présente également des propriétés anesthésiques locales.

Fenistil gel est indiqué lors d'affections de la peau avec démangeaisons, par ex. lors de piqûres d'insectes, de coup de soleil léger et peu étendu, de brûlures légères de petite surface, de dermatoses allergiques peu étendues.

Fenistil contient un gel hydrique qui permet au principe actif de bien pénétrer dans la peau; les démangeaisons et irritations cutanées sont ainsi rapidement soulagées (après quelques minutes). Le gel est inodore, incolore, et ne tache pas le linge.

Quand Fenistil gel ne doit-il pas être utilisé?

Vous ne devez pas utiliser Fenistil gel si vous êtes allergique au maléate de dimétindène ou à un excipient.

Ne pas appliquer la préparation en cas d'allergie connue aux piqûres d'insectes.

Ne pas appliquer la préparation sur les plaies ouvertes ou enflammées, les dermatoses suintantes ou sur les muqueuses, ni à proximité des yeux, particulièrement chez les petits enfants et les nourrissons.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Fenistil gel?

Ne pas utiliser la préparation pour les enfants de moins de 2 ans sans ordonnance médicale. Eviter l'application sur de grandes surfaces, particulièrement chez les petits enfants et les nourrissons.

Eviter une exposition prolongée au soleil des régions traitées. Consultez votre médecin en cas de démangeaisons très prononcées ou de lésions étendues.

Consultez votre médecin si les symptômes persistent au-delà de 7 jours.

Appliqué sur la peau, Fenistil gel n'a aucun effet ou un effet négligeable sur l'aptitude à la conduite et l'utilisation de machines.

Fenistil gel contient du propylène glycol et peut donc provoquer des irritations cutanées localisées.

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique, en particulier à d'autres médicaments, vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Fenistil gel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou la période d'allaitement?

Durant la grossesse et l'allaitement, n'administrer Fenistil gel qu'avec précaution et ne pas l'appliquer sur des surfaces cutanées étendues, écorchées ou enflammées.

Le gel ne doit pas être appliqué sur les mamelons pendant la période d'allaitement.

Comment utiliser Fenistil gel?

Adultes et enfants dès 2 ans:

Appliquer 2 à 4 fois par jour sur les parties à traiter en couche fine et masser légèrement.

Chez les enfants de moins de 2 ans la préparation ne peut être utilisée que sur ordonnance médicale.

Informez votre médecin sans délai si votre enfant ou vous-même avez ingéré ce médicament par inadvertance.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Fenistil gel peut-il provoquer?

Effets secondaires occasionnels (de 1 à 10 personnes traitées sur 1'000): Sécheresse ou sensation de brûlure de la peau.

Effets secondaires très rares (moins de 1 sur 10'000 personnes traitées): Réactions allergiques de la peau, y compris éruptions cutanées et prurit.

Dans ce cas, arrêtez le traitement, et consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Les médicaments doivent être tenus hors de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Fenistil gel?

1 g de gel contient 1 mg de maléate de dimétindène, propylèneglycol, conservateur: chlorure de benzalkonium et d'autres excipients.

Numéro d'autorisation

38762 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Fenistil gel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 30 et 100 g.



Titulaire de l'autorisation

Novartis Consumer Health Suisse SA, Berne.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2011 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).