

NOTICE : INFORMATION DU PATIENT

Maalox Antacid® 200 mg/400 mg comprimés à croquer
Maalox Antacid® Sans Sucre 200 mg/400 mg comprimés à croquer
Maalox Antacid® 220 mg/380 mg par 10 ml suspension buvable
Maalox Antacid® 230 mg/400 mg par 4,3 ml suspension buvable

Maalox Antacid® Forte 600 mg/400 mg comprimés à croquer
Maalox Antacid® Forte 900 mg/600 mg par 10 ml suspension buvable

(Oxyde d'aluminium - hydroxyde de magnésium)

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte
3. Comment utiliser Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE MAALOX ANTACID/MAALOX ANTACID FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE

Maalox Antacid et Maalox Antacid Forte sont des médicaments à base d'hydroxyde d'aluminium (oxyde d'aluminium hydraté) et d'hydroxyde de magnésium.

Maalox Antacid et Maalox Antacid Forte sont indiqués pour le traitement symptomatique de courte durée de **l'acidité gastrique** et des **douleurs gastriques**. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser ces médicaments pendant plus de 14 jours sans consulter un médecin. Il est également important d'arrêter le traitement dès que vos symptômes ont disparu.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MAALOX ANTACID/MAALOX ANTACID FORTE

N'utilisez jamais Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte

- Si vous êtes allergique à l'oxyde d'aluminium, l'hydroxyde de magnésium ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous avez une atteinte sévère des reins.
- Si vous souffrez d'une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (= mauvaise absorption de glucose et galactose, sortes de sucres) ou un déficit en sucrase/isomaltase (= manque de sucrase et isomaltase, des substances qui décomposent des sucres), vous ne pouvez pas utiliser les comprimés à croquer de Maalox Antacid et Maalox Antacid 230 mg/400 mg par 4,3 ml de suspension buvable.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte.

- Si vous suivez un régime pauvre en phosphore, consultez d'abord votre médecin.
- Si vous présentez des douleurs osseuses, un malaise (état général d'inconfort, fatigue ou maladie) ou une faiblesse musculaire, **arrêtez le traitement et consultez votre médecin.**
- Si vous avez une altération de la fonction rénale. Certains troubles peuvent notamment survenir car le médicament s'accumule dans le sang.
- Si vous souffrez de troubles de la parole, de mouvements anormaux, de troubles intellectuels sévères, d'une chute de la tension artérielle, d'une somnolence, d'une diminution des réflexes ou de troubles au niveau du cœur ou de la respiration, **arrêtez le traitement et consultez votre médecin.**
- Si vous avez une atteinte des reins. Vous devez alors éviter l'utilisation prolongée de médicaments contre l'acidité gastrique (antiacides).
- L'hydroxyde d'aluminium peut être néfaste si vous souffrez de porphyrie (une maladie causée par un trouble de la fabrication du pigment rouge du sang) et si vous subissez une hémodialyse (une thérapie de remplacement de la fonction rénale).
- Si vous êtes allergique au parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle (parabènes : conservateurs). La forme sous suspension de ce médicament contient notamment des parabènes, qui peuvent provoquer des réactions allergiques. Voir également rubrique « Maalox Antacid 220 mg/380 mg par 10 ml suspension buvable et Maalox Antacid Forte 900 mg/600 mg par 10 ml suspension buvable contiennent du parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle (des parabènes : conservateurs). ».
- Si vous êtes diabétique, vu la teneur en sucre des comprimés à croquer. Voir également « Maalox Antacid 200 mg/400 mg comprimés à croquer et Maalox Antacid 230 mg/400 mg par 4,3 ml suspension buvable contiennent du saccharose (sucre). ».

Autres médicaments et Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Si vous utilisez également d'autres médicaments, consultez toujours d'abord votre médecin car les médicaments contre l'acidité gastrique (antiacides) peuvent modifier l'absorption d'autres médicaments.

Attention ! Respectez un intervalle d'au moins 2 heures (4 heures pour les fluoroquinolones) entre la prise de Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte et l'un des médicaments suivants :

- (tétra)cyclines, fluoroquinolones, lincosamides (différents groupes d'antibiotiques)
- glycosides cardiaques tels que p. ex. la digoxine (médicament utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque aiguë)
- antihistaminiques H2, lansoprasole (médicaments contre l'acidité gastrique)
- atropine (utilisée en cas d'inflammation des yeux, en cas de strabisme et au cours d'un examen oculaire)
- préparations à base de fer
- aténolol, métoprolol, propranolol (médicaments contre une tension artérielle élevée)
- diphosphonates, strontiumranélate (médicaments pour la prévention et le traitement de la décalcification osseuse)
- chloroquine (médicament contre la malaria)
- diflunisal, acide méfénamique (médicaments contre la fièvre et la douleur)
- éphédrine, pseudo-éphédrine (médicaments élargissant les voies respiratoires)
- éthambutol, isoniazide (médicaments contre la tuberculose)
- fluorure de sodium (utilisé pour prévenir les caries dentaires)
- gabapentine (pour le traitement de l'épilepsie)
- glucocorticoïdes (médicaments contre les réactions allergiques et les inflammations)
- ibuprofène, indométacine (antidouleurs anti-inflammatoires)
- itraconazole, kétoconazole (médicaments contre les champignons)
- kayexalate (médicament contre une augmentation des concentrations de potassium dans le sang)
- misoprostol (médicament utilisé pour déclencher les contractions en cas d'avortement et pour diminuer le risque d'irritation/d'hémorragie au niveau de l'estomac)
- mycophénolate (médicament réprimant l'immunité naturelle)
- phénothiazines (médicaments contre la psychose) et autres neuroleptiques (médicaments contre les maladies mentales sévères)
- pénicillamine (médicament réprimant les inflammations)
- quinidines (utilisées dans certaines formes de troubles du rythme cardiaque)
- lévothyroxine (médicament utilisé en cas de pathologies de la thyroïde)
- rosuvastatine (médicament contre un cholestérol élevé)
- raltégravir, elvitégravir, dolutégravir (médicaments contre des infections VIH)

L'hydroxyde d'aluminium et les citrates peuvent induire une augmentation des taux d'aluminium, en particulier chez les patients ayant des troubles de la fonction rénale.

Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte avec des aliments, boissons et de l'alcool
Évitez la prise simultanée d'alcool, de café ou de boissons contenant de l'acide citrique telles que les jus de fruits.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

- Ne prenez pas de doses élevées de Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte pendant la grossesse.
- Ne prenez pas Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte pendant plus de deux semaines pendant la grossesse.
- Consultez un médecin si vous souhaitez utiliser Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte pendant plus de deux semaines pendant la grossesse.

Allaitement

- Les composés à base d'aluminium se retrouvent dans le lait maternel.
- Ne prenez pas de doses élevées de Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte si vous allaitez.
- Ne prenez pas Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte pendant plus de deux semaines pendant l'allaitement.
- On pense que la prise de magnésium est compatible avec l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Maalox Antacid 220 mg/380 mg par 10 ml suspension buvable et Maalox Antacid Forte 900 mg/600 mg par 10 ml suspension buvable contiennent du parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle (des parabènes : conservateurs).

Ils peuvent être responsables de l'apparition de réactions allergiques.

Maalox Antacid 200 mg/400 mg comprimés à croquer et Maalox Antacid 230 mg/400 mg par 4,3 ml suspension buvable contiennent du saccharose (sucre).

N'utilisez donc pas ce formulation si vous souffrez d'une maladie héréditaire rare telle qu'une intolérance au fructose, une malabsorption du glucose et du galactose (= mauvaise absorption du glucose et du galactose, des types de sucre) ou une insuffisance en sucrase-isomaltase (= déficit en sucrase et en isomaltase, des substances dégradant les sucres).

Maalox Antacid Sans sucre 200 mg/400 mg comprimés à croquer ne contiennent pas de sucre et conviennent si vous avez un diabète ou si vous suivez un régime hypoglycémiant (pour réguler les taux sanguins de sucre).

3. COMMENT UTILISER MAALOX ANTACID/MAALOX ANTACID FORTE

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Voie et mode d'administration

Les comprimés sont destinés à être mâchés ou sucés.

La suspension doit être avalée.

Maalox Antacid 200 mg/400 mg comprimés à croquer
Maalox Antacid Sans Sucre 200 mg/400 mg comprimés à croquer
Maalox Antacid 230 mg/400 mg par 4,3 ml suspension buvable
Maalox Antacid 220 mg/380 mg par 10 ml suspension buvable

La dose recommandée est :

- **Adultes et enfants à partir de 12 ans :**

- Suspension en flacon (220 mg/380 mg par 10 ml) :
2 à 4 cuillères à café (= 10 à 20 ml) par prise, 4 fois par jour. De préférence une heure après les 3 repas principaux et au coucher.
- Suspension en sachet (220 mg/380 mg par 10 ml) :
1 à 2 sachets (= 10 à 20 ml) par prise, 4 fois par jour. De préférence une heure après les 3 repas principaux et au coucher.
- Suspension en sachet (230 mg/400 mg par 4,3 ml) :
1 à 2 sachets (= 4,3 à 8,6 ml) par prise, 4 fois par jour. De préférence, une heure après les 3 principaux repas et au coucher.
- Comprimés à croquer (200 mg/400 mg) :
1 à 2 comprimés par prise, 4 fois par jour. De préférence une heure après les 3 repas principaux et au coucher.

Si nécessaire, vous pouvez prendre une dose supplémentaire tant de suspension que de comprimés à croquer. Cette prise peut s'effectuer 2 heures après la prise précédente, avec un maximum de 7 prises par jour (ce qui correspond à 28 cuillères à café ou 14 sachets de suspension, ou 14 comprimés à croquer par jour).

Consultez votre médecin si les problèmes digestifs durent plus de **14 jours**.

Maalox Antacid Forte 600 mg/400 mg comprimés à croquer
Maalox Antacid Forte 900 mg/600 mg par 10 ml suspension buvable

Vu que Maalox Antacid Forte n'a pas été étudié chez les enfants, il ne peut être utilisé **que chez les adultes**.

La dose recommandée est :

- **Adultes :**

- Suspension en flacon (900 mg/600 mg par 10 ml) :
2 cuillères à café (= 10 ml) par prise, 4 fois par jour. Une heure après les 3 repas principaux et au coucher.

- Suspension en sachet (900 mg/600 mg par 10 ml) :
1 sachet (= 10 ml) par prise, 4 fois par jour. Une heure après les 3 repas principaux et au coucher.
- Comprimés à croquer (600 mg/400 mg) :
1 à 2 comprimés par prise, 4 fois par jour. Une heure après les 3 repas principaux et au coucher.

Sur avis de votre médecin, vous pouvez prendre encore une dose supplémentaire tant de suspension que de comprimés à croquer. Cette prise peut s'effectuer 2 heures après la prise précédente, avec un maximum de 7 prises par jour pour les suspensions (ce qui correspond à 14 cuillères à café ou 7 sachets de suspension), ou de 10 comprimés à croquer par jour.

Consultez votre médecin si les problèmes digestifs durent plus de **14 jours**.

Si vous avez utilisé plus de Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte que vous n'auriez dû

En cas de prise prolongée de doses très élevées de ce médicament, les symptômes suivants peuvent survenir : tension artérielle faible (hypotension), somnolence, perte des réflexes au niveau des tendons, faiblesse musculaire, troubles respiratoires et du rythme cardiaque (troubles cardiorespiratoires), survenue progressive de troubles de la parole, troubles intellectuels sévères, mouvements anormaux, diarrhée, douleurs abdominales, vomissements.

L'aluminium et le magnésium sont excrétés par voie urinaire ; le traitement du surdosage aigu du magnésium comprend la réhydratation et la diurèse forcée. En cas d'insuffisance rénale, une hémodialyse ou une dialyse péritonéale est nécessaire. Le gluconate de calcium peut être utilisé comme traitement du surdosage de magnésium.

Si vous avez utilisé trop de Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245 245).

Si vous oubliez d'utiliser Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Affections gastro-intestinales :

Les effets indésirables tels que la constipation, qui est un effet indésirable fréquent de l'hydroxyde d'aluminium, et la diarrhée, qui est un effet indésirable fréquent de l'hydroxyde de magnésium, sont considérablement réduits grâce à l'association des deux substances.

Même si le risque de diarrhée se réduit grâce à ce rapport Al/Mg de **Maalox Antacid Forte**, cet effet indésirable peut quand même survenir, surtout en cas d'utilisation excessive.

Affections du système immunitaire :

Réactions d'hypersensibilité, telles que prurit, urticaire, angio-œdème et réactions anaphylactiques (fréquence indéterminé).

Troubles du métabolisme et de la nutrition :

Fréquence indéterminée : hypermagnésiémie, hyperaluminémie, hypophosphatémie, lors de l'utilisation prolongée ou à doses élevées ou même à des doses normales du produit chez des patients qui suivent un régime pauvre en phosphore ou chez des enfants de moins de 2 ans, pouvant induire une augmentation de la résorption osseuse, une hypercalciurie, une ostéomalacie.

Troubles généraux :

On a rarement rapporté des réactions allergiques.

Une rétention d'aluminium peut donner lieu à une neurotoxicité (maladie cérébrale).

Un traitement prolongé peut donner lieu à un déficit sévère en phosphates, à un ramollissement des os et à une accumulation d'aluminium.

En cas d'insuffisance rénale, une rétention de magnésium peut survenir, ce qui peut induire des troubles cardiovasculaires sur le plan clinique.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5. COMMENT CONSERVER MAALOX ANTACID/MAALOX ANTACID FORTE

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Maalox Antacid 220 mg/380 mg par 10 ml suspension buvable :

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Maalox Antacid 230 mg/400 mg par 4,3 ml suspension buvable :

Pas de précautions particulières de conservation.

Maalox Antacid 200 mg/400 mg comprimés à croquer :

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de l'humidité.

Maalox Antacid Sans Sucre 200 mg/400 mg comprimés à croquer :

Pas de précautions particulières de conservation.

Maalox Antacid Forte 900 mg/600 mg par 10 ml suspension buvable :

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Maalox Antacid Forte 600 mg/400 mg comprimés à croquer :

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

N'utilisez pas ce médicament après la **date de péremption** indiquée sur l'emballage extérieur et le flacon après « pas utiliser après » ou « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Maalox Antacid 220 mg/380 mg par 10 ml suspension buvable

- Les substances actives sont l'oxyde d'aluminium hydraté et l'hydroxyde de magnésium. 10 ml de suspension (2 cuillères à café ou 1 sachet) contiennent 440 mg d'oxyde d'aluminium hydraté (= 220 mg d'oxyde d'aluminium) et 380 mg d'hydroxyde de magnésium.
- Les autres composants sont : parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, acide citrique anhydre, saccharine sodique, sorbitol à 70%, mannitol, huile essentielle de menthe poivrée, acide chlorhydrique concentré, peroxyde d'hydrogène, eau purifiée.

Ce que contient Maalox Antacid 230 mg/400 mg par 4,3 ml suspension buvable

- Les substances actives sont l'oxyde d'aluminium hydraté et l'hydroxyde de magnésium. 4,3 ml de suspension (1 sachet) contient 460 mg d'oxyde d'aluminium hydraté (= 230 mg d'oxyde d'aluminium) et 400 mg d'hydroxyde de magnésium.
- Les autres composants sont: solution de saccharose 64 %, sorbitol liquide, gomme de xanthane, guar, arôme naturel citron vert, chlorure de sodium, solution de peroxyde d'hydrogène 30 %.

Ce que contient Maalox Antacid 200 mg/400 mg comprimés à croquer

- Les substances actives sont l'oxyde d'aluminium hydraté et l'hydroxyde de magnésium. 1 comprimé à croquer contient 400 mg d'oxyde d'aluminium hydraté (= 200 mg d'oxyde d'aluminium) et 400 mg d'hydroxyde de magnésium.
- Les autres composants sont : mannitol, sorbitol, saccharine sodique, saccharose amylicé, poudre de menthe poivrée, stéarate de magnésium, saccharose.

Ce que contient Maalox Antacid Sans Sucre 200 mg/400 mg comprimés à croquer

- Les substances actives sont l'oxyde d'aluminium hydraté et l'hydroxyde de magnésium. 1 comprimé à croquer contient 400 mg d'oxyde d'aluminium hydraté (= 200 mg d'oxyde d'aluminium) et 400 mg d'hydroxyde de magnésium.
- Les autres composants sont : solution de sorbitol, maltitol, glycérol (85 %), saccharine sodique, arôme citron vert, talc, stéarate de magnésium, eau purifiée

Ce que contient Maalox Antacid Forte 900 mg/600 mg par 10 ml suspension buvable

- Les substances actives sont l'oxyde d'aluminium hydraté et l'hydroxyde de magnésium. 10 ml de suspension (2 cuillères à café ou 1 sachet) contiennent

1800 mg d'oxyde d'aluminium hydraté (= 900 mg d'oxyde d'aluminium) et 600 mg d'hydroxyde de magnésium.

- Les autres composants sont : acide citrique anhydre, huile essentielle de menthe poivrée, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, saccharine sodique, sorbitol à 70%, méthylcellulose 4000 cps, émulsion de siméthicone, peroxyde d'hydrogène, eau purifiée.

Ce que contient Maalox Antacid Forte 600 mg/400 mg comprimés à croquer

- Les substances actives sont l'oxyde d'aluminium hydraté et l'hydroxyde de magnésium. 1 comprimé à croquer contient 1200 mg d'oxyde d'aluminium hydraté (= 600 mg d'oxyde d'aluminium) et 400 mg d'hydroxyde de magnésium.
- Les autres composants sont : xylitol, cellulose, triglycérides, glycérol, polysorbate 80, saccharine sodique dihydratée, stéarate de magnésium, talc, arôme citron, huile essentielle de menthe poivrée.

Aspect de Maalox Antacid 220 mg/380 mg par 10 ml suspension buvable et contenu de l'emballage extérieur

Suspension buvable.

Flacon en plastique de 250 ml, 355 ml et 500 ml (emballage clinique). Boîte de 20 sachets (papier/Alu/PE-film) de 10 ml.

Aspect de Maalox Antacid 230 mg/400 mg par 4,3 ml suspension buvable et contenu de l'emballage extérieur

Suspension homogène blanche à jaune pâle pour voie orale.

Boîtes de 20 sachets de 4,3 ml, constitués de polypropylène-Aluminium-Polyéthylène

Aspect de Maalox Antacid 200 mg/400 mg comprimés à croquer et contenu de l'emballage extérieur

Comprimés à croquer.

Boîtes de 12, 40 et 100 comprimés à croquer sous plaquettes thermoformées en PVC/Alu.

Aspect de Maalox Antacid Sans Sucre 200 mg/400 mg comprimés à croquer et contenu de l'emballage extérieur

Comprimés à croquer blancs à jaunes, ronds, gravés, ayant des bords biseautés et une odeur citron vert.

Boîtes de 20, 40 comprimés à croquer sous plaquette thermoformée : feuille d'aluminium, compatible avec le PVC ou PVDC

Aspect de Maalox Antacid Forte 900 mg/600 mg par 10 ml suspension buvable et contenu de l'emballage extérieur

Suspension buvable.

Flacon en plastique de 250 ml, 355 ml et 500ml (emballage clinique). Boîte de 20 ou 50 sachets (papier/Alu/PE-film) de 10 ml.

Aspect de Maalox Antacid Forte 600 mg/400 mg comprimés à croquer et contenu de l'emballage extérieur

Comprimés à croquer.

Boîte de 40 et 100 comprimés à croquer sous plaquettes thermoformées.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel.: 02/710.54.00
e-mail : info.belgium@sanofi.com

Fabricants

Maalox Antacid 200 mg/400 mg comprimés à croquer
Maalox Antacid Sans Sucre 200 mg/400 mg comprimés à croquer
Maalox Antacid Forte 600 mg/400 mg comprimés à croquer
Maalox Antacid 220 mg/380 mg par 10 ml suspension buvable *en flacon*
Maalox Antacid 230 mg/400 mg par 4,3 ml suspension buvable *en sachet*
Maalox Antacid Forte 900 mg/600 mg par 10 ml suspension buvable *en flacon*

sanofi-aventis S.p.A.
Viale Europa 11
21040 Origgio
Italie



Maalox Antacid 220 mg/380 mg par 10 ml suspension buvable *en sachets*
Maalox Antacid Forte 900 mg/600 mg par 10 ml suspension buvable *en sachets*

Pharmatis S.A.S.
60190 Estrée-Saint-Denis
France

Maalox Antacid 200 mg/400 mg comprimés à croquer
Maalox Antacid Sans Sucre 200 mg/400 mg comprimés à croquer
Sanofi-Aventis S.p.A.
S.S. 17 km 22 67019 Scoppito (AQ)
Italie

Maalox Antacid 230 mg/400 mg par 4,3 ml suspension buvable *en sachets*
A.Nattermann & Cie. GmbH
Nattermannallee 1
50829 Keulen
Allemagne

Mode de délivrance : délivrance libre

Maalox Antacid 220 mg/380 mg par 10 ml suspension buvable *en flacon* est enregistré sous le numéro BE0474476

Maalox Antacid 220 mg/380 mg par 10 ml suspension buvable *en sachets* est enregistré sous le numéro BE345956

Maalox Antacid 230 mg/400 mg par 4,3 ml suspension buvable est enregistré sous le numéro BE411476

Maalox Antacid 200 mg/400 mg comprimés à croquer est enregistré sous le numéro BE047467

Maalox Antacid Sans Sucre 200 mg/400 mg comprimés à croquer est enregistré sous le numéro BE411467

Maalox Antacid Forte 900 mg/600 mg par 10 ml suspension buvable *en flacon* est enregistré sous le numéro BE125973

Maalox Antacid Forte 900 mg/600 mg par 10 ml suspension buvable *en sachets* est enregistré sous le numéro BE345965

Maalox Antacid Forte 600 mg/400 mg comprimés à croquer est enregistré sous le numéro BE185394

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 10/2013

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 07/2013