

**NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR**  
**GAVISCON BABY suspension buvable**



Alginate de sodium et bicarbonate de sodium

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours prendre Gaviscon Baby avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes de votre enfant s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

**Dans cette notice**

1. Qu'est ce que Gaviscon Baby et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Gaviscon Baby ?
3. Comment prendre Gaviscon Baby?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Gaviscon Baby?
6. Informations supplémentaires.

**1. QU'EST CE QUE GAVISCON BABY ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Gaviscon Baby est utilisé dans le traitement symptomatique des régurgitations acides (reflux).

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE GAVISCON BABY?**

**Ne donnez jamais Gaviscon Baby à votre enfant**

- s'il est allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans Gaviscon Baby.

**Faites attention avec Gaviscon Baby**

- si votre enfant doit suivre un régime pauvre en sel strict,
- s'il a trop de calcium dans le sang,
- s'il a des calculs rénaux.

Il est important de respecter la posologie recommandée en raison de la teneur en sodium élevée de Gaviscon Baby.

Si votre enfant prend déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique «Prise d'autres médicaments par votre enfant».

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour votre enfant, ou si elle l'a été dans le passé.

**Prise d'autres médicaments par votre enfant**

Si votre enfant prend ou a pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien

Aucune interaction médicamenteuse n'est à ce jour connue avec Gaviscon. Les inhibiteurs de la sécrétion d'acide gastrique (antacides) sont susceptibles de modifier la résorption de certains médicaments tels que la digoxine (médicament utilisé dans l'insuffisance cardiaque et les arythmies), les tétracyclines (un type d'antibiotiques), les antagonistes des récepteurs H<sub>2</sub> (antacides).

### **Aliments et boissons**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Gaviscon peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement sauf lorsqu'il est nécessaire de réduire les apports de sel.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **Informations importantes concernant certains composants de Gaviscon Baby**

Chaque dose de 10 ml contient 145 mg de sodium. Si votre enfant doit suivre un régime pauvre en sel strict, comme lors de certaines pathologies rénales et cardiovasculaires, il faut tenir compte de la présence de sodium.

Gaviscon contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et parahydroxybenzoate de propyle (E216). Ces agents conservateurs peuvent provoquer des réactions allergiques (parfois différées).

### **3. COMMENT PRENDRE GAVISCON BABY?**

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Gaviscon Baby est disponible en flacon avec seringue pour administration orale, étalonnée par ml : la dose est de 1 à 2 ml/kg/jour à répartir selon le nombre de repas et à administrer après chaque biberon ou repas.

La dose habituelle est :

- de 0 à 1 mois: 1 ml après chaque repas (6 fois par jour)
- de 1 à 2 mois: 1,5 ml après chaque repas (5 fois par jour)
- de 2 à 4 mois: 2 ml après chaque repas (5 fois par jour)
- de 4 à 18 mois: 2,5 ml après chaque repas (4 fois par jour)
- au-delà de 18 mois: 5 ml après chaque repas (4 fois par jour)

La dose de Gaviscon Baby doit être prise après les repas et ne peut être mélangée au lait ou aux aliments.

Le traitement sera poursuivi jusqu'à disparition des symptômes.

Parallèlement à l'emploi de Gaviscon Baby, les conseils alimentaires suivants sont indiqués en cas de reflux :

- épaississez suffisamment l'alimentation,
- administrez les repas en petites portions.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez un médecin.

### **Mode d'administration**

Bien agiter le flacon avant l'emploi.

- A l'aide de la seringue pour administration orale aspirer la quantité de suspension nécessaire.
- Administrer cette suspension à votre enfant à l'aide de la seringue pour administration orale.
- Rincer et sécher la seringue pour administration orale soigneusement après utilisation.

### **Si votre enfant a pris plus de Gaviscon Baby qu'il n'aurait dû**

Il est peu probable que votre enfant ressente des troubles, s'il a pris de trop fortes doses. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'impression que votre enfant se sent ballonné.

Si votre enfant a pris trop de Gaviscon, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245 245).

#### **Si vous oubliez de donner Gaviscon Baby à votre enfant**

Si vous avez oublié de donner une dose de ce médicament à votre enfant, donnez-la dès que vous vous en souvenez. S'il est presque l'heure de prendre la dose suivante attendez jusqu'à ce moment pour la prendre et passez la dose oubliée. Ne donnez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée.

#### **Si vous arrêtez l'administration de Gaviscon Baby**

Le traitement peut être arrêté sans précaution particulière.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, Gaviscon Baby peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Dans de très rares cas, si votre enfant est sensible à certains constituants, il peut présenter des manifestations allergiques comme des éruptions cutanées ou des difficultés respiratoires.

Si vous remarquez chez votre enfant un des effets mentionnés comme grave ou si votre enfant présente des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### **5. COMMENT CONSERVER GAVISCON BABY?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas mettre au réfrigérateur. Bien refermer le flacon après usage. Ne pas utiliser au-delà de 30 jours après ouverture.

Ne pas utiliser Gaviscon Baby après la date de péremption mentionnée sur le flacon et la boîte après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne peuvent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### **6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

##### **Que contient Gaviscon Baby ?**

Les substances actives sont: 500 mg d'alginate de sodium et 267 mg de bicarbonate de sodium (par 10 ml)

Les autres composants sont: carbonate de calcium, carbomère, hydroxyde de sodium, saccharinate de sodium, arôme fenouil, arôme de banane, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), eau purifiée.

##### **Qu'est-ce que Gaviscon Baby et contenu de l'emballage extérieur**

Gaviscon Baby est une suspension de couleur crème avec une odeur caractéristique de banane. Gaviscon Baby est disponible en flacons de 150 ml ou 300 ml. Chaque conditionnement contient une seringue pour administration orale de 6 ml (étalonnée par 0,5 ml).

**Mode de délivrance :** Délivrance libre

**Numéro de l'Autorisation de mise sur le marché :** BE386802

**Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

*Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :*  
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA



Allée de la Recherche 20, B-1070 Bruxelles

*Fabricant:*

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited  
Dansom Lane, Hull  
HU8 7DS East Yorkshire, Royaume-Uni

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 06/2012.**