

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**LANSOYL PARAFFINE 78,230 g/100 g gel oral**

Huile de paraffine



Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours l'utiliser avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 10 jours, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LANSOYL PARAFFINE et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser LANSOYL PARAFFINE ?
3. Comment utiliser LANSOYL PARAFFINE ?
4. Effets indésirables éventuels
5. Comment conserver LANSOYL PARAFFINE ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE LANSOYL PARAFFINE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

En raison de son action en tant que laxatif, LANSOYL PARAFFINE est indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation.

Avertissement : la constipation doit en premier lieu être traitée par un changement dans le mode de vie et par un régime alimentaire adapté. Consultez à ce propos votre pharmacien ou votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER LANSOYL PARAFFINE ?**N'utilisez jamais LANSOYL PARAFFINE :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament et mentionnés à la rubrique 6.
- Chez les enfants de moins de 4 ans car le médicament peut faire obstacle au fonctionnement normal du réflexe de défécation.
- En cas d'occlusion (intestinale) et de douleurs abdominales dont la cause est inconnue.
- Si vous avez des problèmes pour avaler en raison du risque d'inhalation via les voies respiratoires et d'infection pulmonaire (pneumopathie lipoïde).

Faites attention avec LANSOYL PARAFFINE

- Si vous l'utilisez pendant une période prolongée. Ceci doit être déconseillé afin que vous ne vous retrouviez pas dans une situation où vous ne pourriez plus vous passer de laxatifs. De

même, un usage prolongé de LANSOYL PARAFFINE peut diminuer l'absorption des vitamines liposolubles (A, D, E et K).

- Si vous êtes affaibli(e) et alité(e), en raison du risque d'inhalation via les voies respiratoires et d'infection pulmonaire (pneumopathie lipoïde). Ce risque est cependant minime pour LANSOYL PARAFFINE étant donné sa présentation sous forme de gelée à usage oral.
- Si vous devez suivre un régime pauvre en glucides, vous devrez tenir compte de la concentration en saccharose : 2,12 g par cuillère à soupe, 0,70 g par cuillère à café.

Utilisation d'autres médicaments

L'usage simultané d'un laxatif à usage rectal tel le docusate de sodium ou le dioctylsulfosuccinate de sodium peut provoquer une augmentation de l'absorption de l'huile de paraffine (composant de LANSOYL PARAFFINE) du fait que cette huile va s'émulsifier.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament en plus de LANSOYL PARAFFINE, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Aliments et boissons

L'huile de paraffine peut réduire l'absorption des vitamines liposolubles.

LANSOYL PARAFFINE doit être pris de préférence environ 2 heures avant ou après le repas principal et la prise éventuelle de vitamines liposolubles.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Grossesse

Actuellement, on ne connaît pas de contre-indications à l'usage de LANSOYL PARAFFINE pendant la grossesse chez l'être humain. Cependant, LANSOYL PARAFFINE ne sera utilisé que pour des périodes brèves.

Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement :

Actuellement, on ne connaît pas de contre-indications à l'usage de LANSOYL PARAFFINE pendant l'allaitement chez l'être humain. Cependant, LANSOYL PARAFFINE ne sera utilisé que pour des périodes brèves.

Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

Informations importantes concernant certains composants de LANSOYL PARAFFINE

LANSOYL PARAFFINE contient du saccharose (2,12 g par cuillère à soupe et 0,70 g par cuillère à café). Si votre médecin vous a dit que vous ne tolérez pas certains sucres, prenez contact avec lui avant de prendre ce médicament. La prudence est de mise chez les patients atteints de diabète.

LANSOYL PARAFFINE contient du rouge cochenille A. Ce produit peut provoquer des réactions allergiques.

3. COMMENT UTILISER LANSOYL PARAFFINE ?

Suivez scrupuleusement ces instructions. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Si vous ne constatez aucune amélioration, veuillez consulter à nouveau votre médecin.

Adultes et enfants de plus de 14 ans :

1 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Enfants de 4 à 14 ans:

1 à 3 cuillerées à café par jour.

L'utilisation de LANSOYL PARAFFINE est déconseillée chez l'enfant de moins de 4 ans.

La prise peut avoir lieu en une ou en plusieurs fois, de préférence le matin à jeun, ou deux heures avant ou après le repas principal et la prise éventuelle de vitamines liposolubles. Si le médicament est pris le soir, il est indiqué de ne pas s'allonger dans les deux heures qui suivent la prise et de tenir compte du fait que l'effet de LANSOYL PARAFFINE ne se produit que 6 à 8 heures après la prise.

N.B.: Chez l'enfant, l'administration de laxatifs doit être exceptionnelle, étant donné qu'elle peut faire obstacle au fonctionnement normal du réflexe de défécation.

L'usage prolongé de laxatifs doit être évité. La constipation chronique nécessite une adaptation de l'alimentation et du mode de vie.

Si vous avez utilisé plus de LANSOYL PARAFFINE que vous n'auriez dû

En cas de surdosage, des selles grasses peuvent être observées. En règle générale, il suffit d'arrêter le traitement pour faire disparaître les symptômes.

Si une trop grande quantité de LANSOYL PARAFFINE a été avalée, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245 245).

Si vous oubliez d'utiliser LANSOYL PARAFFINE

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Poursuivez simplement le traitement prescrit en veillant à ne jamais utiliser plus que la dose recommandée.

Si vous arrêtez de prendre LANSOYL PARAFFINE

À utiliser uniquement en cas de symptômes.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

4. EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, LANSOYL PARAFFINE peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

L'utilisation de fortes doses d'huile de paraffine expose au risque de suintement anal (lorsque de l'huile de paraffine s'écoule par l'anus), parfois avec irritation autour de l'anus, et peut dans certains cas entraîner une aggravation des symptômes de pertes de selles (incontinence fécale). Dans tous ces cas, il suffit d'arrêter le traitement pour faire disparaître les symptômes.

L'huile de paraffine est très faiblement résorbée par la couche de mucus qui tapisse la paroi interne du tube digestif (tractus gastro-intestinal) et peut donner lieu, après utilisation prolongée, au développement de réactions allergiques (réactions granulomateuses/ lésions tissulaires).

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LANSOYL PARAFFINE ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C dans l'emballage d'origine.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après « EXP ». La mention indique un mois et une année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ils seront alors détruits comme il se doit et ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Ce que contient LANSOYL PARAFFINE

La substance active dans ce médicament est l'huile de paraffine à raison de 78,230 g/100 g.

Les autres composants dans ce médicament sont : saccharose, acide citrique monohydraté, gélatine, rouge cochenille A, aromate et eau purifiée.

Qu'est-ce que LANSOYL PARAFFINE et contenu de l'emballage extérieur

LANSOYL PARAFFINE gel à usage oral est disponible dans un flacon en verre de 225 g. Le produit est de couleur rouge et peut s'étaler.

Mode de délivrance

Délivrance libre.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse



Fabricant

FARMEA
Site d'Angers
10, Rue Bouché Thomas
BP 723
F-49000 ANGERS CEDEX 01
FRANCE

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché

BE022775_

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est août 2011

Cette notice a été approuvée en 11/2012