

**NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**  
**Laxido Orange**  
**poudre pour solution buvable**



**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Ce médicament est disponible sans ordonnance. Toutefois, vous devez quand même prendre Laxido Orange avec prudence pour en tirer les meilleurs bénéfices.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Vous devez contacter un médecin en cas d'aggravation de vos symptômes ou d'arrêt de l'amélioration au bout de 14 jours pour la constipation chronique, ou au bout de 3 jours pour l'impaction fécale.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que Laxido Orange et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Laxido Orange
3. Comment prendre Laxido Orange
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Laxido Orange
6. Informations supplémentaires

**1. QU'EST-CE QUE LAXIDO ORANGE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE**

Le macrogol 3350 est un laxatif utilisé dans le traitement de la constipation, notamment en cas de constipation prolongée. Il est également utilisé pour traiter l'accumulation de selles dures dans votre intestin, pouvant résulter d'une constipation de longue durée (on parle alors d'impaction fécale). Le macrogol 3350 ramollit vos selles et facilite leur passage, soulageant ainsi vos problèmes de constipation. Les électrolytes aident à maintenir le sodium, le potassium et l'eau présents dans votre organisme à des niveaux normaux pendant votre traitement de la constipation.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LAXIDO ORANGE**

**Ne prenez jamais Laxido Orange**

- si vous êtes allergique (hypersensible) au macrogol 3350, au chlorure de sodium, à l'hydrogénocarbonate de sodium, au chlorure de potassium ou à l'un des autres composants contenus dans Laxido Orange
- en cas de perforation de la paroi de votre intestin
- en cas d'occlusion intestinale
- en cas de paralysie intestinale (par exemple, vos intestins peuvent cesser de fonctionner suite à un acte de chirurgie intestinale ou à une grave infection)
- en cas de rectocolite hémorragique, de maladie de Crohn ou de colectasie

Si l'une de ces situations s'applique à vous, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **Faites attention avec Laxido Orange**

Avant de prendre Laxido Orange pour traiter une impaction fécale, il est recommandé de faire confirmer ce diagnostic par votre médecin.

### **Prise d'autres médicaments**

Certains médicaments, par exemple les antiépileptiques, peuvent ne pas fonctionner efficacement s'ils sont pris en concomitance avec le Laxido Orange. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Vous ne devez pas prendre d'autres médicaments par voie orale pendant une heure avant et pendant une heure après la prise de Laxido Orange.

### **Aliments et boissons**

Les aliments et boissons n'ont aucune influence sur l'effet de Laxido Orange.

### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, parlez-en à votre médecin avant de prendre Laxido Orange.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Laxido Orange n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

### **Informations importantes concernant certains composants de Laxido Orange**

Laxido Orange contient 0,68mmol (26mg) de potassium par sachet. Cela doit être pris en compte si vous prenez plus d'un sachet par jour et si vous souffrez d'insuffisance rénale, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium.

Laxido Orange contient 8,13mmol (187mg) de sodium par sachet. Cela doit être pris en compte si vous suivez un régime pauvre en sodium.

## **3. COMMENT PRENDRE LAXIDO ORANGE**

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin ou votre pharmacien. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Laxido Orange est à prendre par voie orale.

Chez l'adulte, l'enfant (âgé de 12 ans et plus) et le sujet âgé :

La dose habituelle pour la constipation est d'un sachet à prendre une à trois fois par jour.

Généralement, ce traitement contre la constipation ne dépasse pas deux semaines.

La dose habituelle pour l'impaction fécale est de huit sachets par jour. Tous les huit sachets doivent être pris sur une période de six heures. Généralement, ce traitement contre l'impaction fécale ne dépasse pas trois jours. Si vous avez une maladie cardiaque, ne prenez pas plus de deux sachets (dans 250ml d'eau) en l'espace d'une heure.

Laxido Orange doit être reconstitué en dissolvant le contenu d'un sachet dans un verre d'eau (125ml). Si vous êtes traité(e) pour une impaction fécale, vous pouvez dissoudre le contenu des huit sachets en même temps dans un récipient de grande contenance (dans un litre d'eau).

Il se peut que votre traitement dure plus de deux semaines en cas de constipation prolongée, ou en cas de maladie responsable de la constipation (telle que la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques), ou si vous prenez d'autres médicaments ordinaires pouvant favoriser la constipation. Dans ce cas, votre médecin pourra réduire votre dose à un sachet, à prendre une ou deux fois par jour.

#### **Si vous avez pris plus de Laxido Orange que vous n'auriez dû**

Il se peut que vous ressentiez des douleurs sévères et un gonflement de l'abdomen, ou des vomissements ou diarrhées. Si vous avez pris trop de Laxido Orange, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-Poison (070.245.245).

#### **Si vous oubliez de prendre Laxido Orange**

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous constatez l'oubli, puis reprenez le traitement comme avant. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

#### **Si vous arrêtez de prendre Laxido Orange**

Pour tirer le plus de bénéfice possible de Laxido Orange, terminez toujours le traitement recommandé par votre médecin ou votre pharmacien. Vous serez certain(e) de voir disparaître votre constipation, et cela évitera que les symptômes dont vous souffrez persistent.

Vous devez contacter un médecin en cas d'aggravation de vos symptômes ou d'arrêt de l'amélioration au bout de 14 jours pour la constipation chronique, ou au bout de 3 jours pour l'impaction fécale.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS**

Comme tous les médicaments, Laxido Orange peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez un des effets secondaires suivants, arrêtez de prendre Laxido Orange et consultez immédiatement votre médecin :

- signes de réaction allergique grave, de type difficulté respiratoire ou gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge
- signes d'allergie, de type éruption cutanée, rougeur du visage, urticaire, démangeaisons ou essoufflement
- signes d'une perturbation des taux hydriques ou électrolytiques de votre corps, de type gonflement (principalement au niveau des chevilles), sensation de fatigue, déshydratation ou

augmentation de la sensation de soif accompagnée de céphalées. Ces symptômes peuvent signifier que les taux de potassium dans votre sang sont supérieurs ou inférieurs à la normale.

Les effets secondaires suivants sont également possibles :

- douleur abdominale
- sensation de ballonnement
- gaz
- indigestion
- douleur au niveau de l'anus (postérieur)
- légère diarrhée
- nausées
- vomissements
- gonflement de l'abdomen
- borborygmes

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER LAXIDO ORANGE**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Laxido Orange après la date de péremption mentionnée sur la boîte et le sachet. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Vous devez conserver les sachets fermés à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas utiliser Laxido Orange si vous remarquez que l'un des sachets est endommagé.

La solution reconstituée de Laxido Orange peut être couverte et conservée au réfrigérateur (2°C à 8°C) et doit être utilisée dans les six heures. Après six heures, toute solution non utilisée devra être jetée.

Les sachets inutilisés de Laxido Orange ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des sachets inutilisés dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

### **Que contient Laxido Orange**

Les substances actives sont le macrogol 3350 (13,125 g), le chlorure de sodium (350,7 mg), l'hydrogénocarbonate de sodium (178,5 mg) et le chlorure de potassium (46,6 mg). Les autres composants sont l'acésulfame de potassium (E950) et l'arôme orange (contenant de la maltodextrine et du propylène glycol (E1520)).

### **Comment se présente Laxido Orange et contenu de l'emballage extérieur**

Laxido Orange est une poudre blanche présentée en sachets. Elle a le goût et l'odeur de l'orange.

Chaque sachet contient 13,8 g de poudre et est présenté en boîtes de 2, 8, 10, 20, 30, 50 et 100 sachets. Ces présentations ne sont pas toutes commercialisées.

**Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché**

Galen Limited  
Seagoe Industrial Estate  
Craigavon  
BT63 5UA  
Royaume-Uni



**Fabricant**

Almac Pharma Services Limited  
Almac House  
20 Seagoe Industrial Estate  
Craigavon  
BT63 5QD  
Royaume-Uni

Co-Pharma Limited  
Unit 4  
Metro Centre  
Tolpits Lane  
Watford  
Hertfordshire  
WD18 9SS  
Royaume-Uni

**Représentant local**

Tramedico NV  
Walgoedstraat 12 A  
9140 Temse  
Belgique

**Numéro de l'Autorisation de mise sur le marché**

BE 325175

**Délivrance**

Délivrance libre

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 07/2012.**

Laxido est une marque commerciale