

Nicotinate de méthyle 1,5 g/100 g , Salicylate de glycol 5,0 g/100 g, Méphénésine 10,0 g/100 g

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours utiliser Algipan baume avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.



- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 3 jours, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce qu'Algipan baume et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Algipan baume?
3. Comment utiliser Algipan baume?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Algipan baume?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALGIPAN BAUME ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE?

Algipan baume est une pommade contre les douleurs musculaires et articulaires.

Algipan baume peut être utilisé pour soulager les douleurs des muscles et des ligaments ou les contractures douloureuses (réduction des tissus musculaires).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ALGIPAN BAUME?

N'utilisez jamais Algipan baume

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la nicotinate de méthyle, la salicylate de glycol ou la méphénésine ou à l'un des autres composants contenus dans Algipan baume.
- Sur les muqueuses.
- En cas d'affection et/ou d'infection de la peau: plaies ouvertes, vésicules, cloques, brûlures.
- Chez les enfants de moins de 7 ans.

Faites attention avec Algipan baume

- Evitez le contact avec les yeux et les muqueuses.
- Lavez-vous les mains après utilisation.
- Si vous utilisez d'autres médicaments, veuillez également lire la rubrique « Utilisation d'autres médicaments ».

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous utilisez ou avez utilisé récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Aliments et boissons

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

La prudence est de mise pendant la grossesse, en particulier au cours des 3 premiers et des 3 derniers mois.

Utilisez le baume Algipan le moins longtemps possible et sur une superficie la plus réduite possible.

Eviter par préférence l'utilisation de ce produit pendant l'allaitement (lactation) car il peut modifier le goût du lait.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Informations importantes concernant certains composants d'Algipan baume

Algipan baume contient du parahydroxybenzoate de méthyle et du parahydroxybenzoate de propyle: ces composants peuvent provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

3. COMMENT UTILISER ALGIPAN BAUME?

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle est :

Masser doucement la région douloureuse jusqu'à pénétration complète de la pommade.

Appliquez la pommade plusieurs fois par jour.

Lavez-vous les mains après utilisation.

Algipan baume ne peut pas être utilisé de manière prolongée.

Algipan baume ne peut pas être utilisé chez les enfants de moins de 7 ans.

Consultez votre médecin s'il n'y a pas d'amélioration dans 3 jours. Votre médecin vous racontera combien de jours vous devez utiliser Algipan baume.

Si vous avez utilisé plus d'Algipan baume que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé ou pris trop d'Algipan baume, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Aucun cas d'intoxication (empoisonnement) n'a été signalé lors de l'application locale du produit.

Si vous oubliez d'utiliser Algipan baume

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Si vous arrêtez d'utiliser Algipan baume

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, Algipan baume peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Allergie: des démangeaisons et des éruptions. Il faut alors arrêter le traitement.
- Une rougeur à l'endroit où l'on applique le baume. Cette réaction locale est normale.
- Irritation de la peau.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ALGIPAN BAUME?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A conserver à température ambiante (15-25°C).

A conserver dans l'emballage extérieur d'origine. Ne pas utiliser Algipan baume après la date de péremption mentionnée sur la boîte/la tube après « EXP ». Là, il y a un mois et un an. Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les deux ou quatre derniers l'année. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

Que contient Algipan baume?

- Les substances actives sont nicotinate de méthyle 1,5 g/100 g , salicylate de glycol 5,0 g/100 g, méphénésine 10,0 g/100 g
- Les autres composants sont cire d'abeille blanche - parfum de lavande - parahydroxybenzoate de méthyle - parahydroxybenzoate de propyle - méthylcellulose - macrogol 100 stéarate - macrogol 100 ether stéarique - sorbitol (solution à 70 %) - monostéarate de glycérol - eau purifiée.

Qu'est ce qu'Algipan baume et contenu de l'emballage extérieur ?

Tube aluminium avec 40 g, 80 g et 140 g de pommade.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 – B-2880 Bornem

Numéro d'autorisation de mise sur le marché: BE162951

Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2009.

