

Notice : Information de l'utilisateur
Antigriphine 500 mg/65 mg comprimés pelliculés
paracétamol/caféine



Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Antigriphine et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Antigriphine
3. Comment prendre utiliser Antigriphine
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Antigriphine
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Antigriphine et dans quel cas est-il utilisé ?

Antigriphine est un médicament contre la fièvre et la douleur. Antigriphine contient le paracétamol et la caféine. Antigriphine est indiquée pour le traitement symptomatique de la fièvre et de la douleur.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Antigriphine ?

Ne prenez jamais Antigriphine

- si vous êtes allergique au paracétamol, à la caféine, à la phenacétine ou à l'un de autres composants de ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez (eu) ou votre enfant a (eu) un grave problème de fonctionnement du foie (insuffisance hépatique grave).
- l'administration répétée du paracétamol est contre-indiquée si vous souffrez d'anémie, de maladie cardiaque ou de maladie pulmonaire.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Antigriphine.

- Utilisez ce médicament le moins longtemps possible et uniquement tant que les symptômes persistent. Il n'est en effet pas totalement exclu que le paracétamol joue un rôle dans le développement de certaines maladies rénales.
- Consultez votre médecin si votre foie ou vos reins fonctionnent mal.
- La consommation excessive d'alcool doit être évitée pendant le traitement avec ce médicaments, car il peut avoir un effet nocif pour le foie.
- Le risque de dommage au foie peut être accru chez les patients utilisant des médicaments qui augment la production des enzymes hépatiques tels que les barbituriques (certains somnifères et anesthésiques) et des médicaments contre les crises d'épilepsie (anticonvulsivants).
- l'usage chronique pourrait entraîner une insuffisance rénale.
- il faut éviter une consommation excessive de caféine en prenant ce produit. Thé, café et certaines boissons en canettes contiennent de la caféine

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Enfants

Ce médicament n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.

Autres médicaments et Antigriphine

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médication.

- Lors d'une prise de comprimés en trop grande quantité, l'administration de charbon actif diminue l'absorption du paracétamol par l'organisme.
- Le paracétamol peut renforcer l'effet du chloramphénicol (un certain antibiotique).
- L'administration concomitante de diflunisal (un médicament contre les inflammations) augmente le taux de paracétamol dans le sang, risquant ainsi d'endommager le foie.
- Ce médicament peut être utilisé en combinaison avec des anticoagulants, mais peut accroître le risque de saignement s'il est pris plus de quelques jours.
- pendant la durée du traitement il est recommandé de ne pas abuser de boissons alcoolisées.

Antigriphine avec des aliments et boissons

Ce médicament contient de la caféine. Éviter de boire trop de boissons contenant de la caféine (p. ex. thé, café et autres boissons contenant de la caféine) en prenant ce médicament. Une forte consommation de caféine peut résulter en des troubles du sommeil, des tremblements, et une sensation désagréable dans la poitrine, due à des palpitations.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, si vous planifiez une grossesse ou si vous allaitez, demander conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Usage déconseillé au cours de la grossesse.

Usage à éviter durant l'allaitement.

Aucune donnée disponible concernant la fertilité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il n'y a pas de données disponibles sur l'effet sur la conduite et la capacité à utiliser des machines lors l'utilisation de ce médicament.

3. Comment prendre Antigriphine ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Adultes : 1 ou 2 comprimés pelliculés, jusqu'à 3 fois par jour.

Utilisation chez les enfants

Enfants de 12 ans et plus : 1 comprimé pelliculé, jusqu'à 3 fois par jour.

Enfants de moins de 12 ans : pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.

- Prenez les comprimés avec un verre d'eau
- La période entre deux prises doit être de 4 heures au moins. En cas de l'éthylisme chronique l'intervalle devrait être de 8 heures au moins.
- Utilisez ce médicament le moins longtemps possible et uniquement tant que les symptômes persistent. Adressez-vous à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

- N'utiliser pas ce médicament en même temps que d'autres médicaments contenant du paracétamol.
- Ne pas dépasser la dose indiquée ; adultes ne doivent pas dépasser 6 comprimés par jour, enfants de 12 ans et plus ne doivent pas dépasser 3 comprimés par jour.
- Chez les patients dont la fonction hépatique est altérée, la dose sera moins élevée.

Si vous avez pris plus de Antigripine que vous n'auriez dû

Si vous ou quelqu'un d'autre avez pris ce médicament en trop grande quantité, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245). Les signes d'un dosage excessif sont pâleur, nausées et vomissements et se manifestent habituellement dans les 12 à 24 heures, les problèmes de fonctionnement du foie n'apparaissent que 3 jours après le surdosage. L'hospitalisation est nécessaire, même si le surdosage n'est que présumé.

Une insuffisance rénale aiguë avec néphrite interstitielle aiguë peut se développer, même en l'absence de lésion hépatique grave.

Traitement:

Si un patient a pris une dose excessive de paracétamol, l'estomac doit être vidé aussi rapidement que possible par un lavage d'estomac ou en faisant vomir le patient. Le patient peut se voir administrer du charbon actif mais la mesure thérapeutique consiste toutefois en l'injection de N-acétyl-cystéine dans une veine.

Si vous oubliez de prendre Antigripine

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Affections hématologiques et du système lymphatique (Sang) :

- Thrombocytopénie (affection sanguine se manifestant par des hématomes et une tendance aux saignements)

Affections du système immunitaire (réactions allergiques) :

- Anaphylaxie (réaction allergique potentiellement mortelle caractérisée par la pâleur, la transpiration, l'agitation, un rythme cardiaque accéléré et une diminution du niveau de conscience)
- Des réactions d'hypersensibilité cutanée telles qu'urticaires et papules et des rougeurs de la peau (érythème)
- Angio-œdème (gonflement soudain de la peau et des muqueuses (ex. gorge ou langue), difficultés respiratoires et/ou démangeaison et éruption cutanée, souvent en réaction allergique)
- Syndrome de Stevens Johnson (réaction allergique sévère associée à de fortes fièvres, des ampoules sur la peau, des douleurs articulaires et/ou une inflammation oculaire)

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales (respiration) :

- Etouffement provoqué par la contraction des muscles des voies respiratoires (bronchospasmes) chez les patients allergiques à l'aspirine et autres AINS (groupe d'analgésiques aux propriétés anti-inflammatoires et antipyrétiques).

Affections hépatobiliaires (foie) :

- Troubles de fonctionnement du foie

Système nerveux central :

- Nervosité
- Vertige.

Si l'un des réactions ci-dessus surviennent, il y a lieu d'interrompre le traitement et consulter immédiatement un médecin.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5. Comment conserver Antigriphine

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

N'utiliser pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Que contient Antigriphine

- Les substances actives sont le paracétamol et la caféine.
- Les autres composants sont *noyau du comprimé pelliculé*: amidon prégélatinisé, amidon de maïs, polyvidone, sorbate de potassium, talc, acide stéarique, croscarmellose de sodium, eau purifiée; *enrobage du comprimé pelliculé*: hypromellose, triacétine et encre Imaje 5312 (E133).

Aspect de Antigriphine et contenu de l'emballage extérieur

Antigriphine est un comprimé pelliculé pour usage oral. Antigriphine est emballé dans des plaquettes thermoformées. Une boîte contient 20 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Omega Pharma Belgium NV
Venecoweg 26
B-9810 Nazareth

Fabricant

GlaxoSmithKline (Dungarvan) Ltd
Knockbrack - Dungarvan
Co. Waterford, Irlande

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

Numéro d'Autorisation de Mise sur le Marché

BE168463



La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 08/2013