

ANGIPAX,

comprimé orodispersible

Apis mellifica 4 DH, Belladonna 4 DH, Mercurius corrosivus 8 DH, Mercurius solubilis 8 DH, Phytolacca decandra 4 DH, Pulsatilla 4 DH.

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que ANGIPAX, comprimé orodispersible et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ANGIPAX, comprimé orodispersible ?
3. Comment prendre ANGIPAX, comprimé orodispersible ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ANGIPAX, comprimé orodispersible ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ANGIPAX, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des angines non bactériennes (inflammation, douleur, rougeur, fièvre).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ANGIPAX, comprimé orodispersible ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ANGIPAX, comprimé orodispersible :

- En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.
- Hypersensibilité à l'un des composants.

Faites attention avec ANGIPAX, comprimé orodispersible :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).
Compte tenu de la présence de la souche PULSATILLA dans la formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'otite ou de sinusite sans avis médical.

Prise d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Alimentation et boissons :

Ce médicament est à prendre à distance des repas.

Grossesse et allaitement :

Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de ANGIPAX, comprimé orodispersible :

Ce médicament contient du xylitol, du lactose et de l'aspartam (E951).

3. COMMENT PRENDRE ANGIPAX, comprimé orodispersible ?

Posologie

Adultes :

2 comprimés 2 à 4 fois par jour.

Enfants de 6 à 12 ans :

1 comprimé 2 à 4 fois par jour.

Enfants de moins de 6 ans :

1 comprimé 2 à 4 fois par jour.

Chez l'enfant de moins de 3 ans, un avis médical est recommandé.

Répéter la prise toutes les 3 à 6 heures.

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

Mode d'administration

Voie sublinguale.

Laisser fondre le comprimé sous la langue, de préférence en dehors des repas.

Chez l'enfant de moins de 6 ans, faire dissoudre le comprimé dans un peu d'eau avant la prise en raison du risque de fausse route.

Durée du traitement

Traitement de 5 jours maximum.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ANGIPAX, comprimé orodispersible est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ANGIPAX, comprimé orodispersible ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ANGIPAX, comprimé orodispersible après la date de péremption mentionnée sur la plaquette et le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient ANGIPAX, comprimé orodispersible ?

Les substances actives sont :

Apis mellifica	4 DH	12,5 mg
Belladonna	4 DH	12,5 mg
Mercurius corrosivus	8 DH	12,5 mg
Mercurius solubilis	8 DH	12,5 mg
Phytolacca decandra	4 DH	12,5 mg
Pulsatilla	4 DH	12,5 mg

Pour un comprimé orodispersible de 250 mg.

Les autres composants sont :

Xylitol, cellulose microcristalline, lactose, aspartam (E951), croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.

Qu'est ce que ANGIPAX, comprimé orodispersible et contenu de l'emballage extérieur ?

ANGIPAX, comprimé orodispersible se présente sous forme de comprimé orodispersible de 250 mg conditionné sous plaquettes thermoformées.
Boîte de 2 plaquettes de 20 comprimés orodispersibles.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 30/11/2009.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).



Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



622136-01

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France



ANGIPAX,

orodispersible tablet

Apis mellifica 4 DH, Belladonna 4 DH, Mercurius corrosivus 8 DH, Mercurius solubilis 8 DH, Phytolacca decandra 4 DH, Pulsatilla 4 DH.

Please read this leaflet carefully before using this drug. It contains important information about your treatment.

If you have any questions or if there is anything you are unsure of, ask your doctor or pharmacist for more information.

- Keep this leaflet, you may need to read it again.

- Ask your pharmacist if you need more information or advice.

- You must contact a doctor if your symptoms worsen or do not improve after 2 days.

- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effect not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

1. What is ANGIPAX, orodispersible tablet, and when should it be used?
2. What do you need to know before taking ANGIPAX, orodispersible tablet?
3. How to take ANGIPAX, orodispersible tablet.
4. What are the possible side effects?
5. How to store ANGIPAX, orodispersible tablet.
6. Further information

1. WHAT IS ANGIPAX, orodispersible tablet, AND WHEN SHOULD IT BE USED?

A homeopathic medicine traditionally used for the treatment of non-bacterial tonsillitis (inflammation, pain, redness, fever).

2. WHAT DO YOU NEED TO KNOW

BEFORE TAKING ANGIPAX, orodispersible tablet?

If your doctor has told you that you are unable to tolerate certain sugars, contact your doctor before taking this drug.

Do not take ANGIPAX, orodispersible tablet:

- If you have phenylketonuria (a hereditary condition detected at birth) ; because of the presence of aspartame.
- Hypersensitivity to one of the constituents.

Take special care with ANGIPAX, orodispersible tablet:

The use of this drug is not advised in the case of patients presenting with galactose intolerance, Lapp lactase deficiency or glucose or galactose malabsorption syndrome (rare hereditary conditions). Because of the presence of PULSATILLA stock in this formulation, this drug should not be used without medical advice in the case of otitis or sinusitis.

Taking other medicines

If you are taking or have recently taken another drug, including a drug obtained without prescription, speak to your doctor or pharmacist.

Taking ANGIPAX, orodispersible tablet with food and drink

This drug should not be taken with meals.

Pregnancy and breast-feeding:

Ask advice from your doctor or pharmacist before taking any drug.

Important information about some of the ingredients of ANGIPAX, orodispersible tablet:

This drug contains xylitol, lactose and aspartame (E951).

3. HOW TO TAKE ANGIPAX, orodispersible tablet.

Posology

Adults: 2 tablets 2 to 4 times a day.

Children from 6 to 12 years of age:

1 tablet 2 to 4 times a day.

Children under 6 years of age:

1 tablet 2 to 4 times a day.

In the case of children under 3 years of age, medical advice is recommended.

Repeat the administration every 3 to 6 hours.

Reduce the frequency of the administrations if there is an improvement and stop taking the drug if the symptoms disappear.

Method of administration

Sublingual route.

Let the tablet decompose under the tongue, preferably between meals.

In the case of children under 6 years of age, allow the tablet to dissolve in a little water before taking it because of the risk of it going down the wrong way.

Length of treatment

Maximum of 5 days.

4. WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE EFFECTS ?

Like all drugs, ANGIPAX, orodispersible tablet, may have side effects, although they may not be experienced by everyone. If you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if some side effects become serious, please inform your doctor or pharmacist.

5. HOW TO STORE ANGIPAX, orodispersible tablet.

Keep out of reach and sight of children.

Do not take ANGIPAX, orodispersible tablet, after the expiry date given on the blister or the external packaging.

To be stored at a temperature below 25°C.

Drugs should not be disposed of via the drains or along with household rubbish.

Ask your pharmacist what to do with unused drugs. This is to protect the environment.

6. FURTHER INFORMATION

What does ANGIPAX, orodispersible tablet, contain?

The active ingredients are :

Apis mellifica	4 DH	12.5 mg
Belladonna	4 DH	12.5 mg
Mercurius corrosivus	8 DH	12.5 mg
Mercurius solubilis	8 DH	12.5 mg
Phytolacca decandra	4 DH	12.5 mg
Pulsatilla	4 DH	12.5 mg

For one orodispersible 250 mg tablet.

The other constituents are :

Xylitol, microcrystalline cellulose, lactose, aspartame (E951), sodium croscarmellose, magnesium stearate.

What is ANGIPAX, orodispersible tablet and contents of the pack ?

ANGIPAX, orodispersible tablet, is presented as 250 mg orodispersible tablets packed in blisters.

A box of 2 blisters of 20 orodispersible tablets.

The latest date this leaflet was approved is 30/11/2009.

Detailed information about this drug is available on the website of Afssaps [French Medicines Agency].



LEHNING
LABORATOIRES

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France