

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

NEO-CUTIGENOL 0,7g/100g + 400.000 U.I./100g pommade

Diacétate de chlorhexidine
Vitamine A palmitate



Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours utiliser NEO-CUTIGENOL avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que NEO-CUTIGENOL et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser NEO-CUTIGENOL
3. Comment utiliser NEO-CUTIGENOL
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver NEO-CUTIGENOL
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE NEO-CUTIGENOL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE

NEO-CUTIGENOL est une pommade désinfectante et cicatrisante à usage externe. Elle contient un désinfectant (diacétate de chlorhexidine) et de la vitamine A.

NEO-CUTIGENOL est une pommade grasse. Elle convient donc surtout aux lésions sèches, et non aux affections cutanées humides.

NEO-CUTIGENOL est utilisé pour :

- plaies, ulcères et irritations de la peau,
- brûlures à cicatrisation lente,
- engelures des mains ou des pieds (tuméfactions rouge-bleu, douloureuses, très prurigineuses, aux orteils et/ou aux doigts) et gerçures,
- érythème fessier des nouveau-nés (rougeur de la peau au niveau du linge).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER NEO-CUTIGENOL

N'utilisez jamais NEO-CUTIGENOL

Si vous êtes allergique (hypersensible) au diacétate de chlorhexidine ou à la vitamine A palmitate ou à l'un des autres composants contenus dans NEO-CUTIGENOL.

Faites attention avec NEO-CUTIGENOL

- Éviter l'application de NEO-CUTIGENOL sur le visage, à proximité des yeux ou sur les muqueuses. En cas de contact accidentel de NEO-CUTIGENOL avec les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment à l'eau.

- N'utilisez pas la pommade pendant plus de 7 jours en cas de traitement de surfaces étendues, surtout en présence d'une peau endommagée (p.ex. brûlures), et sous pansement occlusif (pansement qui protège la peau du contact de l'air).
- Ne pas utiliser dans l'oreille en cas de perforation du tympan.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Il n'y a toutefois pas d'interaction connue entre NEO-CUTIGENOL et d'autres médicaments.

Aliments et boissons

Pas d'application.

Grossesse et allaitement

NEO-CUTIGENOL peut être utilisé en faible quantité durant la grossesse et l'allaitement. La prudence est néanmoins recommandée en cas d'application sur une surface étendue, surtout sur une peau endommagée (en cas de brûlures) et sous pansement occlusif (pansement qui protège la peau du contact de l'air). Voyez aussi la rubrique « *Faites attention avec NEO-CUTIGENOL* ».

Si vous utilisez simultanément un autre produit contenant de la vitamine A tout comme NEO-CUTIGENOL, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien, surtout au cours des 3 premiers mois de grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

NEO-CUTIGENOL n'a aucune influence sur l'aptitude à conduire un véhicule et à utiliser des machines.

Informations importantes concernant certains composants de NEO-CUTIGENOL

Le butylhydroxyanisole, le butylhydroxytoluène et la graisse de laine peuvent provoquer :

- des réactions cutanées locales (ex : dermatite de contact, inflammation de la peau à la suite d'un contact avec des substances irritantes ou de substances pour lesquelles il existe une hypersensibilité),
- une irritation des yeux et des muqueuses.

3. COMMENT UTILISER NEO-CUTIGENOL

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

NEO-CUTIGENOL est une pommade à usage externe.

Étaler NEO-CUTIGENOL en couche relativement épaisse sur une compresse de gaze et l'appliquer sur la lésion.

Renouveler le pansement selon le besoin : en général 1 à 2 fois par jour.

Éviter l'utilisation simultanée de NEO-CUTIGENOL et de savon.

Si vous avez utilisé plus de NEO-CUTIGENOL que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé trop de NEO-CUTIGENOL, ou que vous en avez ingéré par accident, prenez immédiatement contact avec votre médecin, pharmacien ou avec le Centre Antipoisons (070/245.245).

En rapport avec le composant actif chlorhexidine

En cas d'application locale, la résorption de la chlorhexidine par la peau est si faible que le risque de surdosage est quasi inexistant.

Étant donné que la chlorhexidine n'est résorbée que de façon minimale au niveau du système digestif, il est peu probable qu'une ingestion accidentelle donne lieu à des effets sur l'organisme, sauf en cas d'ingestion de très grandes quantités du produit.

*En rapport avec le composant actif **vitamine A***

La quantité de vitamine A qui est absorbée dans l'organisme, en application locale sur la peau, est moindre que la dose quotidienne recommandée de vitamine A. Le risque d'intoxication est peu probable si le NEO-CUTIGENOL est correctement utilisé.

La quantité de vitamine A contenue dans NEO-CUTIGENOL (200.000 U.I., 400.000 U.I. et 600.000 U.I. par tube de 50 g, 100 g ou 150 g respectivement) est trop faible pour entraîner un risque de surdosage en cas d'ingestion accidentelle.

Les signes précoces les plus fréquents d'une intoxication se manifestent au niveau de la peau : coloration jaunâtre, rougeur de la peau, épaissement de la couche supérieure de la peau, fissures, ongles fragiles, perte de cheveux. L'hypervitaminose A (intoxication par l'utilisation d'une trop forte dose de vitamine A) peut entraîner, chez les jeunes enfants, par exemple à des céphalées, une tension de la fontanelle chez le bébé (espace entre les os du crâne qui doivent encore fusionner) et des douleurs osseuses. Ces symptômes sont réversibles après l'arrêt du traitement.

Si vous oubliez d'utiliser NEO-CUTIGENOL

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser NEO-CUTIGENOL

Utiliser uniquement en cas de symptômes.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, NEO-CUTIGENOL peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Dans de rares cas, les effets indésirables suivants peuvent se manifester sur la peau :

- réaction allergique à la chlorhexidine,
- extrêmement rarement allergie de contact (hypersensibilité à certaines substances après leur contact avec la peau) à la vitamine A,
- irritation cutanée,
- photosensibilité (hypersensibilité à la lumière ou à la lumière du soleil).

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER NEO-CUTIGENOL

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C .

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser NEO-CUTIGENOL après la date de péremption mentionnée sur le tube et la boîte après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient NEO-CUTIGENOL

- Les substances actives du NEO-CUTIGENOL sont, pour 100 g de pommade : 0,7 g de diacétate de chlorhexidine et 400.000 U.I. de palmitate de vitamine A
- Les autres composants du NEO-CUTIGENOL sont:
 - Dioxyde de titane (E171)
 - Oxyde de zinc
 - Huile de foie de morue (Type A)
 - Butylhydroxyanisole
 - Butylhydroxytoluène
 - Cire d'abeille jaune
 - Paraffine liquide
 - Graisse de laine
 - Vaseline jaune.

Qu'est-ce que NEO-CUTIGENOL et contenu de l'emballage extérieur

Tubes de 50 g, 100 g et 150 g en aluminium vernis.

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Takeda Belgium
Chaussée de Gand 615
1080 Bruxelles

Fabricant

Takeda GmbH
Robert-Bosch-Str.8
78224 Singen
Allemagne



Numéro de l'autorisation de mise sur le marché

BE185464

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 03/2013.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 01/2014.