Notice

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

GAVISCON ANTIACIDE – ANTIREFLUX suspension buvable.

Alginate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium et carbonate de calcium.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Ce médicament est disponible sans prescripton médicale. Toutefois, vous devez toujours prendre Gaviscon Antiacide – Antireflux avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Gaviscon Antiacide - Antireflux et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Gaviscon Antiacide - Antireflux?
3. Comment prendre Gaviscon Antiacide - Antireflux ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Gaviscon Antiacide – Antireflux ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE GAVISCON ANTIACIDE - ANTIREFLUX ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Gaviscon Antiacide - Antireflux est une association composée de deux antiacides (carbonate de calcium et hydrogénocarbonate de sodium) et d'un alginate. Son mécanisme d'action est double :

1. Il neutralise l'excès d'acide dans l'estomac, soulageant ainsi la douleur et la gêne.
2. Il forme une barrière de protection au niveau du contenu de l'estomac, ce qui atténue la sensation de brûlure que vous ressentez dans la poitrine.

Ce médicament est utilisé pour traiter les symptômes acides du reflux gastro-œsophagien tels que la régurgitation acide, les brûlures d'estomac et l'indigestion, survenant par exemple après un repas ou pendant la grossesse.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GAVISCON ANTIACIDE - ANTIREFLUX SUSPENSION BUVABLE ?

Ne prenez jamais Gaviscon :

Si vous savez que vous êtes allergique (hypersensible) à l'un des composants contenus dans Gaviscon.

Faites attention avec Gaviscon :

Ce médicament contient de petites quantités de sodium (5,53 mmol par 10 ml) et de calcium (3,25 mmol par 10 ml). S'il vous a été recommandé de suivre un régime limitant l'apport de l'un de ces éléments, veuillez consulter votre médecin.

Si vous souffrez ou avez souffert d'une maladie rénale ou cardiaque significative, demandez conseil à votre médecin concernant la teneur en sel du médicament, car certains sels peuvent avoir un effet sur ces maladies.
Gaviscon ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une diminution sévère de la fonction rénale ni chez les patients présentant une hypophosphatémie ;
Il convient d'éviter toute utilisation prolongée.
Comme avec d'autres produits antiacides, la prise de Gaviscon peut masquer les symptômes d'autres affections médicales sous-jacentes plus graves.

Consultez votre médecin si vous savez que vous présentez un volume réduit d'acide gastrique dans l'estomac, car il est possible que ce produit soit moins efficace.

Si les symptômes persistent au bout de 7 jours, consultez votre médecin.

Prise d'autres médicaments :
Ne prenez pas ce médicament dans les deux heures qui suivent la prise d'autres médicaments par voie orale, car Gaviscon peut modifier l'effet de certains autres médicaments.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :
Vous pouvez prendre ce médicament si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Comme avec tous les médicaments, la durée de traitement doit être la plus courte possible.

Informations importantes concernant certains composants de Gaviscon
Ce médicament contient du para-hydroxybenzoate de méthyle (E218) et du para-hydroxybenzoate de propyle (E216), qui sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

3. COMMENT PRENDRE GAVISCON ANTIACIDE - ANTIREFLUX ?

Bien agiter avant utilisation.

Adultes, y compris personnes âgées, et enfants de 12 ans et plus : 10-20 ml après les repas et avant le coucher, jusqu'à quatre fois par jour.

Enfants de moins de 12 ans : Uniquement sur avis médical.

Si vous avez pris plus de Gaviscon que vous n'auriez dû
Si vous avez pris une trop grande quantité de ce médicament, il est peu probable que cela vous soit nocif. Toutefois, vous pourriez ressentir des ballonnements. Consultez votre médecin si ce trouble persiste.
Si vous avez pris trop de Gaviscon Antiacide - Antireflux, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-Poison (070 / 245.245).

Si vous oubliez de prendre Gaviscon
Si vous oubliez une dose, il n'est pas nécessaire de prendre une dose double la fois suivante ; continuez simplement à prendre votre suspension comme d'habitude.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Gaviscon peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Si vous développez ces effets indésirables, arrêtez de prendre ce médicament et contactez votre médecin immédiatement. Dans de très rares cas (moins de 1 sur 10 000), une réaction allergique aux composants peut se produire. Les symptômes peuvent inclure une éruption cutanée, des

démangeaisons, des étourdissements ou un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge.
Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER GAVISCON ANTIACIDE - ANTIREFLUX?

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption (EXP : mois/année) mentionnée ▪ Tenir hors de la portée et de la vue des enfants ▪ A conserver à une température ne dépassant pas 30° C ▪ Ne pas mettre au réfrigérateur ni congeler ▪ A utiliser dans les 6 mois suivant l'ouverture ▪ Vérifier si le bouchon scellé est intact avant la première utilisation

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient Gaviscon Antiacide - Antireflux ?
Les substances actives présentes dans 10 ml sont : 500 mg d'alginate de sodium, 213 mg d'hydrogénocarbonate de sodium et 325 mg de carbonate de calcium. Les autres composants sont : carbomère, para-hydroxybenzoates de méthyle (E218) et de propyle (E216), saccharine sodique, arôme menthe poivrée, hydroxyde de sodium et eau. Ce produit ne contient ni sucre ni gluten.

Qu'est-ce que Gaviscon Antiacide -Antireflux et contenu de l'emballage extérieur ?
Gaviscon Antiacide - Antireflux est une suspension de couleur blanc cassé à crème, parfumée et aromatisée à la menthe poivrée.

Gaviscon Antiacide - Antireflux est disponible en flacons de 150 ml, 200 ml, 300 ml et 600 ml.

Mode de délivrance: Médicament non soumis à prescription médicale

Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché : BE373317

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et Fabricant
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA
Allée de la Recherche, 20
1070 Bruxelles

Fabricant
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd
Dansom Lane HU8 7DS – Hull, East Yorkshire
Royaume Uni

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2011