

Hexomedine Lösung 1 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut
Hexomedine Transdermal 1,5 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut

Hexamidin di-isethionat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 bis 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Hexomedine und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Hexomedine beachten?
3. Wie ist Hexomedine anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Hexomedine aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Hexomedine und wofür wird es angewendet?

Hexomidine ist ein Desinfektionsmittel zur äußerlichen Anwendung.

Hexomedine Lösung ist indiziert als Zusatzbehandlung bei Hautinfektionen (Anwendung auf der Haut) und bei infizierten oder möglich infizierten Schleimhäuten.

Hexomedine Transdermal (durch die Haut) wird angewendet als Zusatzbehandlung bei lokal begrenzten Hautinfektionen, insbesondere bei Haarbalgentzündungen (Folliculitis) und bei infizierten Nägeln.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Hexomedine beachten?

Hexomedine darf nicht angewendet werden

- Wenn Sie allergisch gegen Diaminderivate oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Um die Haut zu desinfizieren vor einer Injektion oder um Gegenstände zu sterilisieren.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Hexomedine anwenden.

- Verwenden Sie Hexomedine nicht länger als 5 Tage, besonders wenn Sie es verwenden:
 - unter einem Verband, der ein Austrocknen der Wunde verhindert (Okklusivverband)
 - auf beschädigter Haut (z.B. verbrannter Haut)
 - auf Schleimhäute
 - auf der Haut eines Säuglings
- Vermeiden Sie einen Kontakt mit den Augen.
- Hexomedine Transdermal nicht auf offene Wunden auftragen.

Wenn Sie noch andere Arzneimittel anwenden, bitte lesen Sie dann auch die Rubrik "Anwendung von Hexomidine zusammen mit anderen Arzneimitteln".

Anwendung von Hexomidine zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Es ist auf keinerlei Weise sinnvoll, gleichzeitig oder anschließend noch andere Antiseptika zu verwenden.

Anwendung von Hexomedine zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Über die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit sind bis heute keine nachteiligen Folgen bekannt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend.

Hexomedine Transdermal enthält Propylenglycol. Dies kann Hautreizungen hervorrufen.

3. Wie ist Hexomedine anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Hexomedine Lösung

Hexomedine wird pur, also unverdünnt, 2 bis 3 mal pro Tag entweder lokal aufgetragen oder in Form eines feuchten Umschlags oder als Bad verwendet.

Hexomedine Transdermal

Pur, also unverdünnt, 2 bis 3 mal pro Tag verwenden, entweder in einem feuchten Verband während 30 bis 45 Minuten oder den Finger für 1 bis 3 Minuten direkt in der Lösung in der Flasche baden. Die Flasche ist für die Anfeuchtung eines infizierten Fingers geeignet. Die Transkutan-Lösung darf weder auf offenen Wunden, noch auf den Schleimhäuten, noch unter einem Verband, der ein Austrocknen der Wunde verhindert (Okklusivverband) verwendet werden.

Verwenden Sie Hexomedine nicht länger als 5 Tage, besonders wenn Sie es verwenden unter einem Verband der ein Austrocknen der Wunde verhindert (Okklusivverband), auf beschädigter Haut (z.B. verbrannter Haut), auf Schleimhäute oder auf der Haut eines Säuglings.

Wenn Sie eine größere Menge von Hexomedine angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel Hexomedine verwendet haben, setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder dem Antigiftzentrum (070/245.245) in Verbindung.

Bei versehentlicher oraler Einnahme des Mittels wird die Verabreichung von Aktivkohle (starkes Bindemittel) und eventuell das Durchführen einer Magenspülung empfohlen. Im Falle einer Atmungsdepression muss der Patient so schnell wie möglich ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wenn Sie die Anwendung von Hexomedine vergessen haben

Nicht zutreffend.

Wenn Sie die Anwendung von Hexomedine abbrechen

Nicht zutreffend.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es ist möglich, dass Sie eine Überempfindlichkeit gegen das Mittel entwickeln. Verwenden Sie das Mittel also nicht zu viel oder zu lange, noch auf einer bereits beschädigten oder stark angegriffenen Haut.

Überempfindlichkeit gegen das Mittel kann sich durch ein Kribbelgefühl, Juckreiz, Verbrennungen sowie trockene Haut manifestieren. In Ausnahmefällen sind allergische Hautreaktionen und sogar schwere Überempfindlichkeitsreaktionen (anaphylaktische Reaktionen) möglich.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 BRUSSEL
Website: www.fagg-afmps.be
E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Hexomedine aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25°C lagern.

Haltbarkeit nach Öffnung: 15 Tage.

Falls eine Flasche „Hexomedine Transderm“ als zum Eintauchen eines infizierten Fingers verwendet wird, darf die Lösung nicht länger als 5 Tage verwendet werden.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Verpackung nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen



Was Hexomedine enthält

Hexomedine Lösung:

- Der Wirkstoff ist: Hexamidin di-isethionat 1 mg/ml.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Isopropylalkohol und gereinigtes Wasser.

Hexomedine Transdermal:

- Der Wirkstoff ist: Hexamidin di-isethionat 1,5 mg/ml.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Äthanol 96% , Propylenglykol, Methylal, Nonoxinol 9 und gereinigtes Wasser (Siehe Abschnitt 2 „Hexomedine Transdermal enthält Propylenglycol“).

Wie Hexomedine aussieht und Inhalt der Packung

Hexomedine Lösung: Flasche mit 45 ml oder 250 ml der farblosen Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Hexomedine Transdermal: Flasche mit 45 ml der farblosen Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Melisana NV/SA
Kareelovenlaan 1, Av. du Four à Briques
B-1140 Brüssel

Hersteller

Hexomedine Lösung:
Nattermann & Cie GmbH
Nattermannallee 1
D-50829 Köln
Deutschland

Hexomedine Transdermal:

Aventis Pharma SA
Avenida de Leganes 62
ES-28925 Alcorcón
Spanien

Unither Liquid Manufacturing
1-3 Allée de la NESTE
Z.I. en Sigal
31770 Colomiers
Frankreich



Zulassungsnummer(n)

Hexomedine Lösung: BE002642
Hexomedine Transdermal: BE002466

Art der Abgabe

Apothekenpflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 12/2015.