

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

iso-Betadine Tüll, 10 %, imprägnierter Verband (Polyvidon-Jod)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Ihre Behandlung.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss iso-Betadine Tüll jedoch vorschriftgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist iso-Betadine Tüll und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von iso-Betadine Tüll beachten?
3. Wie ist iso-Betadine Tüll anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist iso-Betadine Tüll aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist iso-Betadine Tüll und wofür wird es angewendet?

Präparat zur äusserlichen Anwendung, um die Haut zu desinfizieren. Enthält Jod (Polyvidon-Jod), ein Antiseptikum, das Mikroben (Bakterien, Viren, Pilze) tötet und Infektionen vorbeugt.

Angezeigt bei :

Schutz und desinfizierender Behandlung von Wunden und Hautkrankheiten wie Brandwunden und Unterschenkelgeschwüren, welche einen fetten Verband erfordern.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von iso-Betadine Tüll beachten?

iso-Betadine Tüll darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich gegen Jod oder einen der sonstigen Bestandteile sind.
- Bei Schilddrüsenerkrankung.
- Bei gleichzeitiger Auftragung auf die Haut von Präparaten, die Quecksilber, Lithium, Alkalien oder Natriumthiosulfat enthalten.
- Bei der Frühgeburt oder bei Kindern unter 30 Monaten.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von iso-Betadine Tüll ist erforderlich,

- Nicht mit einem anderen Arzneimittel oder Präparat für die Haut vermischen.
- Nicht ohne ärztliche Empfehlung bei Kindern zwischen 30 Monaten und 5 Jahren verwenden.
- eine häufige und lang anhaltende Anwendung sowie die Auftragung auf weite Hautflächen ohne ärztliche Empfehlung vermeiden.
- Kontakt mit den Augen vermeiden.
- Die mit iso-Betadine Tüll behandelte Haut zeigt eine orange-braune Färbung, die sich leicht mit Wasser entfernen lässt.
- Bei einer Untersuchung der Schilddrüse den Arzt auf die Anwendung von iso-Betadine Tüll hinweisen.

Bei Anwendung von iso-Betadine Tüll mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

iso-Betadine Tüll kann mit anderen Arzneimitteln oder Präparaten, insbesondere mit Produkten, die

Quecksilber, Lithium, Alkalien oder Natriumthiosulfat enthalten, reagieren.

Die gleichzeitige Verwendung von iso-Betadine Tüll und bestimmte Produkte wie Desinfektionsmittel auf Basis von Silber oder einer Lösung von Wasserstoffperoxyd (gebräuchlich Sauerstoffwasser genannt) kann führen zu einer verringerten Wirkung der einzelnen Produkte. Vor allem bei der Verwendung von Sauerstoffwasser soll man einige Minuten warten bevor Anwendung von iso-Betadine Tüll.

iso-Betadine Tüll kann die Untersuchung der Schilddrüse beeinflussen.

Bei Anwendung von iso-Betadine Tüll zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Nicht zutrefflich.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. iso-Betadine Tüll darf während der Schwangerschaft und der Stillzeit nur nach ärztlicher Verordnung verwendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Nicht zutrefflich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von iso-Betadine Tüll

Polyvidon-Jod ist instabil bei alkalischem pH und wird durch Natriumsulfat inaktiviert.

3. Wie ist iso-Betadine Tüll anzuwenden?

Wenden Sie dieses Produkt immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Übliche Dosierung :

Als Verband einmal am Tage oder öfters auftragen.

Wenn Sie eine größere Menge von iso-Betadine Tüll angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine grössere Menge von iso-Betadine Tüll angewendet haben, die Behandlung einstellen und sich sofort in Verbindung setzen mit Ihrem Arzt, Apotheker oder den Antgiftzentrum (Tel. 070/245 245).

Wenn Sie die Anwendung von iso-Betadine Tüll vergessen haben

Nicht zutrefflich

Wenn Sie die Anwendung von iso-Betadine Tüll abbrechen

Nicht zutrefflich

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich ?

Wie alle Arzneimittel kann iso-Betadine Tüll Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- bei häufiger Anwendung kann eine örtliche Irritation oder eine Allergie auftreten;
- bei wiederholter und lang anhaltender Anwendung können Schilddrüsenstörungen, welche mit Symptomen wie Anschwellen des Halses (Kropf) und Gewichtsänderungen einhergehen, auftreten.
- bei Anwendung auf weite Hautflächen sind eine Abnahme der Nierentätigkeit und eine Erhöhung des BlutnatriumspieTülls möglich.

Einzige Fälle von Urtikaria als auch von anaphylaktischen Schock wurden gemeldet.

Nach Aufnahme von grossen Jodmengen wurden beikommende elektrolytische Störungen und Störungen der Nierenfunktion assoziiert mit schwerer metabolischen Acidose wahrgenommen (insbesondere bei der Behandlung von grossen Brandwunden).

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser

Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist iso-Betadine Tüll aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Zimmertemperatur (15°C-25°C) aufbewahren.

Sie dürfen iso-Betadine Tüll nach dem auf der Verpackung nach „EX“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. Weitere Informationen

Was iso-Betadine Tüll enthält

- Der Wirkstoff ist Polyvidon-Jod.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Macrogol 400 - Macrogol 4000 - Macrogol 6000 - gereinigtes Wasser

Wie iso-Betadine Tüll aussieht und Inhalt der Packung

Mit Gel imprägnierter Verband zur Anwendung auf die Haut.

Einzelpackung und Schachteln zu 5, 10 und 50 Kompressen in Einzelpackung.

Pharmazeutischer Unternehmer

s.a. Meda Pharma n.v. - Chaussée de la Hulpe/Terhulpesteenweg 166 - 1170 Bruxelles/Brussel

Hersteller

Meda Manufacturing - Avenue J.F. Kennedy - F 33700 Merignac

Zulassungsnummer

BE156615

Ablieferung : verschreibungsfrei

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2009.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 02/2015.