



### Mögliche Nebenwirkungen

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes:

Sehr selten kann es zu Überempfindlichkeitserscheinungen, wie z.B. Brennen auf der Haut, kommen.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. WIE IST TYROSUR® GEL AUFZUBEWAHREN?

#### Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden! Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25°C lagern.  
Nach Anbruch 3 Monate haltbar.

### 6. WEITERE INFORMATIONEN

#### Was enthält Tyrosur® Gel?

Der Wirkstoff ist Tyrothricin.  
100 g Gel enthalten 0,1 g Tyrothricin.

#### Die sonstigen Bestandteile sind:

Cetylpyridiniumchlorid 1 H<sub>2</sub>O, Propylenglycol, Ethanol 96%, Carbomer (40 000-60 000 mPa-s), Trometamol, gereinigtes Wasser.

#### Wie sieht Tyrosur® Gel aus und der Inhalt der Packung:

Tyrosur® Gel ist in Packungen mit 5 g (N 1) und 25 g (N 3) Gel erhältlich.

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Herzbergstraße 3, 61138 Niederdorfelden  
Tel.: 06101 539-300, Fax: 06101 539-315  
Internet: [www.engelhard-am.de](http://www.engelhard-am.de)  
E-Mail: [info@engelhard-am.de](mailto:info@engelhard-am.de)

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2014.**



Stand: 01/2014; PB1605500

### Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

# Tyrosur® Gel

Wirkstoff: **Tyrothricin** 1 mg/g

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Tyrosur® Gel jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Tyrosur® Gel und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Tyrosur® Gel beachten?
3. Wie ist Tyrosur® Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Tyrosur® Gel aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST TYROSUR® GEL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

**Tyrosur® Gel ist ein Wundbehandlungsmittel.**

#### Tyrosur® Gel wird angewendet

zur lindernden Behandlung von kleinflächigen, oberflächlichen, wenig nässenden Wunden mit bakterieller Superinfektion mit Tyrothricin-empfindlichen Erregern wie z.B. Riss-, Kratz-, Schürfwunden.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON TYROSUR® GEL BEACHTEN?

Tyrosur® Gel darf nicht angewendet werden:





- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem wirksamen Bestandteil oder einem der sonstigen Bestandteile von Tyrosur® Gel sind.

- auf der Nasenschleimhaut.

#### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Tyrosur® Gel ist erforderlich**

- Bei Anwendung in Augennähe:  
Das Gel darf nicht in die Augen gelangen, da dies zu Brennen führen kann.

#### **Bei Anwendung von Tyrosur® Gel mit anderen Arzneimitteln:**

Es sind keine Arzneimittel bekannt, welche die Wirkung von Tyrosur® Gel beeinflussen oder durch Tyrosur® Gel beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vor Kurzem eingenommen/ angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### **Schwangerschaft:**

Es liegen keine Daten zur Sicherheit einer Anwendung von Tyrosur® Gel bei Schwangeren vor. Das potenzielle Risiko für den Menschen ist aufgrund fehlender Tierstudien nicht bekannt. Daher sollen Sie Tyrosur® Gel in der Schwangerschaft nicht anwenden.

#### **Stillzeit:**

Da nicht bekannt ist, ob Tyrothricin oder Cetylpyridiniumchlorid in die Muttermilch übergeht, sollen Sie Tyrosur® Gel in der Stillzeit nicht anwenden.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Tyrosur® Gel:**

Tyrosur® Gel enthält Propylenglycol und kann daher Hautreizungen hervorrufen.

### **3. WIE IST TYROSUR® GEL ANZUWENDEN?**

Wenden Sie Tyrosur® Gel immer genau nach der Anweisung dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Das Gel wird 2- bis 3-mal täglich in ausreichender Menge aufgetragen.

#### **Art der Anwendung:**

Zum Auftragen auf die Haut.  
Tragen Sie das Gel morgens, (mittags) und abends auf, sodass die betroffenen Hautpartien mit Gel

bedeckt sind. Ein Verband ist bei leichteren Verletzungen oder Hautentzündungen an unbedeckten Körperstellen in der Regel nicht erforderlich. Bei nässenden Wunden empfiehlt sich das Anlegen eines Schutzverbandes, der jeweils nach 1-2 Tagen oder gemäß ärztlicher Anweisung erneuert werden sollte.

#### **Dauer der Anwendung:**

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem klinischen Bild.

Wenn sich die Beschwerden verschlechtern oder wenn innerhalb einer Woche keine Verbesserung eintritt, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt um Rat fragen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Tyrosur® Gel zu stark oder zu schwach ist.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Tyrosur® Gel angewendet haben, als Sie sollten:**

Es sind keine Folgen zu erwarten. Führen Sie die Behandlung, wie in der Dosierungsanleitung angegeben, fort.

Sollten Sie jedoch ungewöhnliche Symptome feststellen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt in Verbindung.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Tyrosur® Gel vergessen haben:**

Setzen Sie die Behandlung, wie in der Dosierungsanleitung angegeben, fort.

#### **Auswirkungen, wenn die Behandlung mit Tyrosur® Gel abgebrochen wird:**

Wenn Sie die Behandlung mit Tyrosur® Gel vorzeitig abbrechen, kann die gewünschte Wirkung nicht eintreten.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Tyrosur® Gel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeiten zugrunde gelegt:

<b>Sehr häufig:</b> mehr als 1 Behandler von 10
<b>Häufig:</b> 1 bis 10 Behandelte von 100
<b>Gelegentlich:</b> 1 bis 10 Behandelte von 1000
<b>Selten:</b> 1 bis 10 Behandelte von 10 000
<b>Sehr selten:</b> weniger als 1 Behandler von 10 000
<b>Nicht bekannt:</b> Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

