

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Enterol 250 mg, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Enterol 250 mg, Hartkapseln

Saccharomyces boulardii



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder Ihrer Pflegefachkraft ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 30 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen beachten?
3. Wie ist Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST ENTEROL 250 MG HARTKAPSELN ODER PULVER ZUR HERSTELLUNG EINER SUSPENSION ZUM EINNEHMEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Wenn Sie sich nach 30 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Enterol 250 mg Hartkapseln: Jede Hartkapsel enthält 250 mg *Saccharomyces boulardii* in lyophilisierter Form (mit mindestens 6 Milliarden lebensfähigen Zellen).

Enterol 250 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen: Jeder Beutel enthält 250 mg *Saccharomyces boulardii* in lyophilisierter Form (mit mindestens 6 Milliarden lebensfähigen Zellen).

- Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen ist zur Vorbeugung von Durchfall angezeigt, der durch die Einnahme von Antibiotika bedingt ist, und zwar bei Personen, die zur Entwicklung von Durchfall mit *Clostridium difficile* oder einem Rückfall von *Clostridium-difficile*-bedingtem Durchfall prädisponiert sind.
- Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen ist zur Behandlung von akutem Durchfall bei Kindern bis 12 Jahre zusätzlich zu einer oralen Rehydratation angezeigt.

2. **WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON ENTEROL 250 MG HARTKAPSELN ODER PULVER ZUR HERSTELLUNG EINER SUSPENSION ZUM EINNEHMEN BEACHTEN?**

Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen *Saccharomyces boulardii* oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie gegen andere Hefen allergisch sind.
- wenn Sie einen zentralen venösen Katheter haben.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker, oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum einnehmen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen ist erforderlich

- Da Durchfall zu einem erheblichen Wasser- und Elektrolytverlust führen kann, ist es wichtig, dass dem Körper unbedingt regelmäßig Flüssigkeit zugeführt wird.
- Wenn Sie Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen mit einer eiskalten Flüssigkeit oder einem eiskalten Nahrungsmittel mischen, oder mit einer Flüssigkeit oder einem Nahrungsmittel, die über 50 °C erhitzt werden können, kann die Aktivität dieses Arzneimittels vermindert sein.
- Wenn Sie bereits andere Arzneimittel einnehmen, lesen Sie ebenfalls die Rubrik „Bei Anwendung von Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen mit anderen Arzneimitteln“.
- Bei:
 - Einer Körpertemperatur über 38 °C;
 - Starken Bauchschmerzen;
 - Blut im Stuhl;
 - Erbrechen in Verbindung mit Durchfall;
 - Anhaltendem Durchfall länger als drei Tage.
- Es kann vorkommen, dass *Saccharomyces boulardii* bei mikrobiologischen Analysen des Stuhls falsch positive Resultate ergibt.
- Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen darf bei Patienten mit schwerer Immundefizienz (z. B. HIV-Infektionen, Organtransplantation, Leukämie, fortgeschrittene bösartige Tumoren, Strahlentherapie, Chemotherapie, hochdosierte Langzeitbehandlung mit Cortison) nicht angewendet werden.

Anwendung von Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Die Einnahme von Arzneimitteln gegen Pilzinfektionen annulliert die Wirkung von Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen.

Einnahme von Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Da Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen aus lebenden Hefezellen besteht, darf es nicht mit einer eiskalten Flüssigkeit

oder einem eiskalten Nahrungsmittel oder mit einer Flüssigkeit oder einem Nahrungsmittel, die über 50 °C erhitzt werden können, angewendet werden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft

Da die Wirkung dieses Arzneimittels bei schwangeren Frauen oder Tieren nicht untersucht wurde, wird von der Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft abgeraten.

Stillzeit

Da die Wirkung dieses Arzneimittels bei stillenden Frauen oder Tieren nicht untersucht wurde, wird von der Anwendung dieses Arzneimittels in der Stillzeit abgeraten.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen hat weder einen Einfluß auf die Fahrtüchtigkeit noch auf die Bedienung von Maschinen.

Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen enthält Lactose (Enterol 250 mg Hartkapseln und Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen) **und/oder Fructose** (Enterol 250 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen). Wenn Ihnen Ihr Arzt gesagt hat, dass Sie bestimmte Zuckerarten nicht vertragen, oder wenn Sie Diabetiker sind, müssen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Kontakt mit ihm aufnehmen.

3. WIE IST ENTEROL 250 MG HARTKAPSELN ODER PULVER ZUR HERSTELLUNG EINER SUSPENSION ZUM EINNEHMEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Ihrer Pflegefachkraft getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder Ihrer Pflegefachkraft nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wenn eine Besserung nach 2 Tagen nicht eintritt, konsultieren Sie erneut Ihren Arzt.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene: 2 bis 4 Hartkapseln oder 2 bis 4 Beutel pro Tag in 2 Einnahmen.

Kinder: 2 Hartkapseln oder 2 Beutel pro Tag, in 2 Einnahmen.

- Hartkapseln: die Hartkapseln mit etwas Wasser schlucken.
- Beutel: das Pulver in einem Glas Wasser auflösen.

Dauer der Behandlung:

Erwachsene: Vorbeugung von Rezidiven oder Rückfällen von *Clostridium-difficile*-bedingtem Durchfall: 4 Wochen.

Kinder: Behandlung von Durchfall zusätzlich zur oralen Rehydratation: 1 Woche.

Sie sollten die Behandlung nicht frühzeitig abbrechen, da Durchfall wieder auftreten könnte.

Wenn Sie eine größere Menge von Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen angewendet oder eingenommen haben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder mit der Giftnotrufzentrale auf (070/245.245).

Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen hat jedoch niemals zu einer Überdosierung geführt.

Wenn Sie die Einnahme von Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen vergessen haben

In diesem Fall können Sie die vergessene Dosis zum Zeitpunkt der nächsten Einnahme einnehmen und Ihre Behandlung fortsetzen, wie von Ihrem Arzt verordnet oder wie oben erwähnt.

Wenn Sie die Einnahme von Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen abbrechen

Der Abbruch einer Behandlung mit Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen ruft keine unerwünschten Wirkungen hervor.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Infektionen und parasitäre Erkrankungen (Krankheiten, die durch einen Parasiten hervorgerufen werden)

Sehr selten (< 1/10.000): Fieber bei Fungämie (Vorhandensein von Pilzen im Blut) aufgrund von *Saccharomyces boulardii*, Mykose (Krankheit, die durch einen Pilz/Schwamm hervorgerufen wird) aufgrund von *Saccharomyces boulardii*.

Erkrankungen des Immunsystems

Sehr selten (< 1/10.000): anaphylaktischer Schock (schwere systemische allergische Reaktion, wobei die Gefäße so erweitert sind, dass der Blutdruck zu niedrig wird und ein Mangel an zirkulierendem Blutvolumen entsteht).

Gefaesserkrankungen

Sehr selten (< 1/10.000): anaphylaktischer Schock.

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums

Sehr selten (< 1/10.000): Dyspnoe (erschwerterte Atmung).

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Sehr selten (< 1/10.000): Pruritus (Juckreiz), Exanthem (Hautausschlag), Quincke-Ödem (Anschwellen des Kehlkopfs mit starken Atembeschwerden). Wenden Sie sich in diesen Fällen sofort an einen Arzt.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Sehr selten (< 1/10.000): Verstopfung, Schmerzen im Oberbauch, Meteorismus im Bauch (Schmerzen im Oberbauch und Meteorismus im Bauch wurden in klinischen Studien beobachtet). Diese Wirkungen machen einen Abbruch der Behandlung nicht erforderlich.

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

Sehr selten (< 1/10.000): Durst.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen

Belgien

Website: www.fagg-afmps.be

E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxembourg/Luxemburg

website: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST ENTEROL 250 MG HARTKAPSELN ODER PULVER ZUR HERSTELLUNG EINER SUSPENSION ZUM EINNEHMEN AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen und Hartkapseln in Glasfläschchen: Bei Raumtemperatur aufbewahren (15 – 25°C).

Hartkapseln in Blisterpackung: keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Verpackung nach «Nicht mehr verwenden nach» oder «Exp» angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen enthält

Enterol 250 mg Hartkapseln:

- Der Wirkstoff ist: 250 mg *Saccharomyces boulardii* in lyophilisierter Form (mit mindestens 6 Milliarden lebensfähigen Zellen).
- Die sonstigen Bestandteile (Hilfsstoffe) sind: Lactose, Magnesiumstearat, Gelatine und Titandioxid E 171.

Enterol 250 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen:

- Der Wirkstoff ist: 250 mg *Saccharomyces boulardii* in lyophilisierter Form (mit mindestens 6 Milliarden lebensfähigen Zellen).
- Die sonstigen Bestandteile (Hilfsstoffe) sind: Lactose, Fructose, hochdisperses Siliciumdioxid und Aroma TuttiFrutti.

Wie Enterol 250 mg Hartkapseln oder Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen aussieht und Inhalt der Packung

Enterol 250 mg Hartkapseln:

Glasfläschchen zu 10, 20, 50 oder 100 Hartkapseln erhältlich.
Blisterpackung (Aluminium und Aluminium / PVC) zu 10, 20, 50 oder 100 Hartkapseln erhältlich.

Enterol 250 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen:
Packungen mit 10, 20, 50 oder 100 Beutels erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

BIOCODEX Benelux NV/SA
Square Marie Curie 20
B-1070 Brüssel
BELGIEN

Hersteller

BIOCODEX
1 avenue Blaise Pascal
F-60000 Beauvais
Frankreich



Zulassungsnummer:

Enterol 250 mg Hartkapseln in Glasfläschchen : BE 269035

Enterol 250 mg Hartkapseln in Blisterpackung : BE 397896

Enterol 250 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen: BE 269026

Für alle Informationen in Verbindung mit diesem Arzneimittel nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt oder Apotheker auf.

Abgabe:

Freie Abgabe

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 02/2015.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 05/2015.

Die folgenden Informationen sind nur für Ärzte bzw. medizinisches Fachpersonal bestimmt.

Öffnen Sie die Beutel (oder die Hartkapseln mit Handschuhen außerhalb des Umfelds von Patienten mit einem zentralen venösen Katheter (hohles Röhrchen in einem großen Blutgefäß).

Bei stationären Patienten mit einem zentralen venösen Katheter, die sogar mit *S. boulardii* nicht behandelt wurden, wurden sehr selten Fälle von Fungämie (Vorhandensein von Pilzen im Blut) beobachtet, die sich durch Fieber und eine positive *Saccharomyces*-Blutkultur äußerten. In allen Fällen entwickelten sich diese Fälle nach Verabreichung von Antimykotika (Arzneimittel gegen Pilze) und gegebenenfalls nach Entfernung des Katheters positiv.