

## **GAVISCON BABY Suspension zum Einnehmen**

Natriumalginat und Natriumhydrogencarbonat

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Gaviscon Baby jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich die Beschwerden Ihres Kindes verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Ihr Kind erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Diese Packungsbeilage beinhaltet**

1. Was ist Gaviscon Baby und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Gaviscon Baby beachten?
3. Wie ist Gaviscon Baby einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gaviscon Baby aufzubewahren?
6. Weitere Informationen.

### **1. WAS IST GAVISCON BABY UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Gaviscon Baby wird angewendet um die Symptome von saurem Aufstoßen (Reflux) zu behandeln.

### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON GAVISCON BABY BEACHTEN?**

#### **Gaviscon Baby darf Ihrem Kind nicht verabreicht werden:**

- wenn es überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Gaviscon Baby ist

#### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Gaviscon Baby ist erforderlich,**

- wenn Ihr Kind eine strenge salzarme Diät einhalten muss,
- wenn es zu viel Calcium im Blut hat,
- wenn es Nierensteine hat.

Wenn Gaviscon Baby verabreicht wird, ist es wegen des erhöhten Natriumgehalts der Suspension zum Einnehmen wichtig, die vorgeschriebene Dosierung einzuhalten.

Wenn Ihr Kind bereits andere Arzneimittel einnimmt, lesen Sie bitte auch den Abschnitt „Bei Einnahme von Gaviscon Baby mit anderen Arzneimitteln“.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, wenn einer dieser Warnhinweise auf Ihr Kind zutrifft oder in der Vergangenheit zutraf.

#### **Bei Einnahme von Gaviscon Baby mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Ihr Kind andere Arzneimittel einnimmt bzw. vor kurzem eingenommen hat, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist keine Wechselwirkung von Gaviscon mit anderen Arzneimitteln bekannt. Magensäuresekretionshemmer (Antazida) können die Aufnahme einiger Arzneimittel wie Digoxin (Arzneimittel zur Behandlung von Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen), Tetracykline (eine Art von Antibiotika), H<sub>2</sub>-Rezeptor-Antagonisten (Antazida) verändern.

**Bei Einnahme von Gaviscon Baby zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**  
Nicht zutreffend.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Gaviscon darf während der Schwangerschaft und der Stillzeit eingenommen werden, es sei denn, die Aufnahme von Salz muss reduziert werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Nicht zutreffend.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Gaviscon Baby**

Jede Dosis zu 10 ml enthält 145 mg Natrium. Wenn Ihr Kind eine strenge salzarme Diät einhalten muss, wie bei bestimmten Nieren- und Herz-Kreislauf-Krankheiten, ist die Anwesenheit von Natrium zu beachten.

Gaviscon enthält Methylparaben (E 218) und Propylparaben (E 216). Diese Konservierungsmittel können allergische Reaktionen auslösen (manchmal zeitverzögert).

### **3. WIE IST GAVISCON BABY EINZUNEHMEN?**

Wenden Sie Gaviscon Baby immer genau nach Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Gaviscon Baby ist erhältlich in einer Flasche mit Applikationsspritze für Zubereitungen zum Einnehmen mit Einteilungen in ml: die Dosis beträgt 1 bis 2 ml/kg/Tag, zu verteilen je nach der Anzahl Mahlzeiten und zu verabreichen nach jeder Flasche oder Mahlzeit.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

- von 0 bis 1 Monat: 1 ml nach jeder Mahlzeit (6 Mal täglich)
- von 1 bis 2 Monate: 1,5 ml nach jeder Mahlzeit (5 Mal täglich)
- von 2 bis 4 Monate: 2 ml nach jeder Mahlzeit (5 Mal täglich)
- von 4 bis 18 Monate: 2,5 ml nach jeder Mahlzeit (4 Mal täglich)
- ab 18 Monaten: 5 ml nach jeder Mahlzeit (4 Mal täglich)

Die Dosis Gaviscon Baby muss nach der Mahlzeit eingenommen werden und darf nicht mit Milch oder Nahrung vermischt werden.

Die Behandlung wird fortgesetzt, bis die Symptome verschwunden sind.

Gleichzeitig mit der Anwendung von Gaviscon Baby werden folgende Ernährungstipps bei Reflux empfohlen;

- verdicken Sie die Nahrung ausreichend
- verabreichen Sie die Mahlzeiten in kleine Portionen.

Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn die Symptome schlimmer werden oder länger als 7 Tage lang anhalten

### **Art der Verabreichung**

Vor Gebrauch kräftig schütteln.

- Mit der Applikationsspritze für Zubereitungen zum Einnehmen die erforderliche Menge Suspension aus der Flasche aufsaugen.
- Suspension dem Kind mithilfe der Applikationsspritze für Zubereitungen zum Einnehmen verabreichen.
- Nach Gebrauch Applikationsspritze für Zubereitungen zum Einnehmen gründlich spülen und trocknen.

### **Wenn Ihr Kind eine größere Menge von Gaviscon Baby eingenommen hat, als es sollte**

Es ist wenig wahrscheinlich, dass Ihr Kind Beschwerden bekommt, wenn es zu hohe Dosen einnimmt. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr Kind sich aufgebläht fühlt.

Wenn Ihr Kind zu viel Gaviscon eingenommen hat, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder mit der Giftnotrufzentrale auf (070/245.245).

#### **Wenn Sie vergessen haben, Ihrem Kind Gaviscon Baby zu verabreichen**

Wenn Sie vergessen haben, Ihrem Kind eine Dosis des Arzneimittels zu verabreichen, tun Sie das, sobald Sie daran denken. Wenn es beinahe Zeit für die folgende Dosis ist, warten Sie bis dahin, um das Arzneimittel zu verabreichen und lassen die vergessene Dosis einfach weg. Verabreichen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

#### **Wenn Sie die Verabreichung von Gaviscon Baby abbrechen**

Die Behandlung kann ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen abgebrochen werden.

#### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Gaviscon Baby Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In sehr seltenen Fällen, wenn Ihr Kind empfindlich gegen bestimmte Bestandteile ist, kann es allergische Reaktionen wie Hautausschlag oder Atemschwierigkeiten bekommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen es erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### **5. WIE IST GAVISCON BABY AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Nicht über 25°C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern. Nach Gebrauch Flaschen fest verschließen. Nach Anbruch nicht länger als 30 Tage verwenden.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf die Flasche und dem Umkarton nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

#### **6. WEITERE INFORMATIONEN**

##### **Was Gaviscon Baby enthält**

- Die Wirkstoffe sind: 500 mg Natriumalginat und 267 mg Natriumhydrogencarbonat (*per 10 ml*).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Calciumcarbonat, Carbomer, Natriumhydroxid, Saccharin-Natrium, Fenchel-Essenz, Bananenaroma, Methylparaben (E 218), Propylparaben (E 216), gereinigtes Wasser.

##### **Wie Gaviscon Baby aussieht und Inhalt der Packung**

Gaviscon Baby ist eine cremefarbene Suspension mit einem charakteristischen Bananengeruch. Es ist in Packungen mit 150 ml oder 300 ml Suspension erhältlich. Jede Packung enthält eine Applikationsspritze für Zubereitungen zum Einnehmen von 6 ml (mit 0,5-ml-Maßstrichen).

**Art der Abgabe:** Freie Abgabe

**Zulassungsnummer:** BE386802.

##### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

*Pharmazeutischer Unternehmer:*  
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA  
Researchdreef 20, B-1070 Brussel



*Hersteller :*  
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited  
Dansom Lane, Hull  
HU8 7DS East Yorkshire, Vereinigtes Königreich

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im: 06/2012.**