

## GAVISCON ANTISÄURE - ANTIREFLUX SUSPENSION ZUM EINNEHMEN.

Natriumalginat, Natriumhydrogencarbonat und Calciumcarbonat.

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was ist Gaviscon Antisäure - Antireflux Suspension zum Einnehmen und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Gaviscon Antisäure - Antireflux Suspension beachten?
3. Wie ist Gaviscon Antisäure – Antireflux Suspension einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gaviscon Antisäure - Antireflux Suspension aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### **1. WAS IST GAVISCON ANTISÄURE - ANTIREFLUX UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Gaviscon Antisäure - Antireflux Suspension zum Einnehmen ist eine Kombination von zwei Antazida (Calciumcarbonat und Natriumhydrogencarbonat) mit einem Alginat und wirkt zweifach:

1. es neutralisiert übermäßige Magensäure und lindert Schmerzen und Beschwerden.
2. es bildet eine Schutzbarriere um den Mageninhalt, um die brennenden Schmerzen in Ihrer Brust zu lindern.

Dieses Arzneimittel wird angewendet zur Behandlung von Säure-bedingten Symptomen von gastroösophagealem Reflux, wie saures Aufstoßen, Sodbrennen und Verdauungsstörung, die beispielsweise nach Mahlzeiten oder während der Schwangerschaft auftreten können.

### **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON GAVISCON ANTISÄURE – ANTIREFLUX BEACHTEN?**

**Gaviscon darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen einen in der Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von dieses Arzneimittels sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen.**

- Wenn Sie an einer Nieren- oder Herzerkrankung leiden oder dies in der Vergangenheit der Fall war, da bestimmte Salze diese Erkrankungen beeinflussen könnten.
- Wenn Sie eine schwere Nierenprobleme haben.
- Wenn Sie Elektrolytstörung haben, die in einen niedrigen Phosphatspiegel im Blut resultiert (Hypophosphatämie).
- wenn Sie wissen, dass Sie geringere Mengen von Magensäure in Ihrem Magen haben, da dieses Produkt dann eine schwächere Wirkung haben kann.

- Wie bei anderen Antazida kann die Einnahme von Gaviscon Antisäure - Antireflux die Symptome anderer, schwererer Basiserkrankungen maskieren.

Bleiben die Symptome nach 7 Tagen bestehen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Kinder**

Geben Sie dieses Arzneimittel nicht an Kinder unter 12 Jahren, es sei denn auf ärztlichen Rat. Bei Kindern mit Nierenproblemen oder entzündeten Magen oder Darm (Gastroenteritis), besteht die Gefahr eines erhöhten Natriumspiegel im Blut (Hypernatriämie).

### **Einnahme von Gaviscon zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht innerhalb zwei Stunden vor oder nach der oralen Einnahme anderer Arzneimittel einnehmen, da es Wechselwirkungen mit bestimmten anderen Arzneimitteln haben kann.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Sie dürfen dieses Präparat einnehmen, wenn Sie schwanger sind, stillen oder ist geplant schwanger zu sein. Wie bei allen Arzneimitteln muss die Dauer der Behandlung so kurz wie möglich gehalten werden.

### **Gaviscon Antisäure – Antireflux enthält:**

- Methyl- (E 218) und Propylhydroxypropylparabene (E 216). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.
- 127,35 mg Natrium (5,53 mmol) pro Dosis. Wenn Sie eine kochsalzarme Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.
- 130 mg Calcium (3,25 mmol) pro Dosis. Wenden Sie an Ihrem Arzt vor der Anwendung dieses Arzneimittels, wenn Sie Nierensteine haben oder haben ein hohes Maß an Calcium im Blut.

### **3. WIE IST GAVISCON ANTISÄURE – ANTIREFLUX EINZUNEHMEN?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Vor der Einnahme kräftig schütteln.

**Erwachsene, einschließlich älterer Patienten, und Kinder ab 12 Jahren:** 10-20 ml nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen, bis zu viermal pro Tag.

**Kinder unter 12 Jahren:** nur nach ärztlicher Empfehlung.

### **Wenn Sie eine größere Menge von Gaviscon eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie zu viel von dieses Arzneimittel eingenommen haben, ist eine schädliche Wirkung unwahrscheinlich. Sie fühlen sich aber möglicherweise aufgebläht. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn diese Wirkung anhält.

Wenn Sie zu viel Gaviscon Antisäure – Antireflux eingenommen haben, nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit Ihrem behandelnden Arzt, Ihrem Apotheker oder der Giftnotrufzentrale auf (070/245.245).

### **Wenn Sie die Einnahme von Gaviscon vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie einfach Ihr normales Einnahmeschema fort.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann –auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn Sie diese Nebenwirkungen feststellen, brechen Sie die Einnahme des Präparates ab und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt. In sehr seltenen Fällen (weniger als 1 von 10.000) besteht die Wahrscheinlichkeit einer allergischen Reaktion auf die Bestandteile. Die Symptome davon können Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Hautausschlag, Juckreiz, Schwindel, oder Anschwellen von Gesicht, Lippen, Zunge, Rachen und Atembeschwerden umfassen.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen.

**Belgien** : Website: [www.fagg-afmps.be](http://www.fagg-afmps.be), E-Mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

**Luxemburg**: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. WIE IST GAVISCON ANTISÄURE - ANTIREFLUX AUFZUBEWAHREN?

- Bewahren Sie diese Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
- Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Flasche und dem Umkarton nach „EXP:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
- Nicht über 30 °C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
- Innerhalb 6 Monate nach dem Öffnen verbrauchen.
- Kontrollieren Sie vor Anbruch, ob die Deckelversiegelung unversehrt ist.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

##### Was Gaviscon Antisäure - Antireflux enthält

Die Wirkstoffe je 10 ml sind 500 mg Natriumalginat, 213 mg Natriumhydrogencarbonat und 325 mg Calciumcarbonat. Die sonstigen Bestandteile sind Carbomer, Methyl- (E 218) und Propylparabene (E 216), Natriumsaccharin, Pfefferminzaroma, Natriumhydroxid und Wasser. Dieses Präparat ist zucker- und glutenfrei.

##### Wie Gaviscon Antisäure - Antireflux aussieht und Inhalt der Packung

Gaviscon Antisäure - Antireflux ist eine gebrochen weiße bis cremefarbene Suspension mit Pfefferminzgeruch und –aroma.

Gaviscon Antisäure - Antireflux ist in Flaschen mit 150 ml, 200 ml, 300 ml und 600 ml erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**Art der Abgabe: Arzneimittel, das nicht der Verschreibungspflicht unterliegt.**

**Zulassungsnummer:** BE373317

##### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:  
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA  
Researchdreef 20  
1070 Brüssel



Hersteller:  
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd  
Dansom Lane HU8 7DS – Hull, East Yorkshire,  
Vereinigtes Königreich

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 03/2016.**