

Calperos®

Pierre Fabre Pharma AG

AMZV

Was ist Calperos und wann wird es angewendet?

Calperos sorgt für die genügende Calciumzufuhr

- zur Deckung eines erhöhten Bedarfes (z.B. Schwangerschaft, Stillzeit, Wachstum, Menopause),
- bei calciumarmer Ernährung (keine oder wenig Milchprodukte),
- zur Unterstützung der Vorbeugung von Knochenschwund (Osteoporose).

Auf Empfehlung eines Arztes oder Apothekers bzw. einer Ärztin oder Apothekerin kann Calperos in Verbindung mit anderen medikamentösen Behandlungen zur Behandlung von Osteoporose und als unterstützendes Mittel bei Allergien verwendet werden.

Wann darf Calperos nicht angewendet werden?

Wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe von Calperos überempfindlich reagieren, bei erhöhten Calciumwerten im Blut, erhöhter Calciumausscheidung im Harn, stark gestörter Nierenfunktion oder wenn Sie von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin aus kein Calcium einnehmen dürfen.

Calperos enthält Aspartam, das bei Phenylketonurie kontraindiziert ist.

Wann ist bei der Einnahme von Calperos Vorsicht geboten?

Bei chronischer Nierenfunktionsstörung oder Steinbildung im Harntrakt.

Wenn Sie gleichzeitig andere Arzneimittel einnehmen müssen, kann es zu Arzneimittel-Wechselwirkungen kommen.

Bei gleichzeitiger Einnahme von Vitamin D wird die Calciumaufnahme erhöht.

Calperos muss mindestens 3 Stunden vor oder nach Einnahme von einem Antibiotikum der Tetracyclin-Gruppe eingenommen werden. Ein zeitlicher Abstand von 2 Stunden zwischen der Einnahme von Calperos und Biphosphonaten, Estramustin (Krebsarzneimittel), Fluor- oder Eisenpräparaten sowie Phenytoin soll eingehalten werden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Darf Calperos während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Calperos kann in der Schwangerschaft und Stillzeit eingenommen werden.

Wie verwenden Sie Calperos?

Falls vom Arzt bzw. der Ärztin nicht anders verordnet, gelten folgende Dosierungsempfehlungen:

Erwachsene: 1'000 mg pro Tag (2 Lutschtabletten).

Kinder: 500–1'000 mg pro Tag (1–2 Lutschtabletten).

Calperos Lutschtabletten sollten gelutscht oder gekaut werden. Nicht schlucken.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt bzw. Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Calperos haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Calperos auftreten: In seltenen Fällen wurden leichte Störungen im Verdauungstrakt wie Blähungen, Verstopfung oder Durchfall beobachtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Calperos ist mit Aspartam gesüsst.

Calperos Lutschtabletten sind bei Raumtemperatur zwischen 15 und 25 °C zu lagern, vor Hitze und Feuchtigkeit zu schützen und für Kinder unerreichbar aufzubewahren.

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Verfalldatum verwendet werden.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist, bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Calperos enthalten?

1 Lutschtablette enthält 1'250 mg Calciumcarbonat (entsprechend 500 mg Calcium), Aspartam, Pfefferminzaroma und Hilfsstoffe.

Zulassungsnummer

53165 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Calperos? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungen zu 24 und 60 teilbaren Lutschtabletten.

Zulassungsinhaberin

Pierre Fabre Pharma AG, 4123 Allschwil.

Diese Packungsbeilage wurde im März 2010 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Publiziert am 06.11.2015